



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO

COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10.1 DEL PSR)

**CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO**

**AVVISO N° 09
DEL
21.06.17**

Prosegue la fase di tempo stabile con temperature prossime o superiori ai 35 °C che stanno determinando un anticipo fenologico sulla norma importantissimo. Attualmente è previsto, da lunedì, un passaggio temporalesco

OIDIO

Attenzione, restano diffusi i riscontri di attacchi, anche sui grappoli. Si consiglia un intervento con fungicidi specifici a base di BUPIMIRATE oppure CYFLUFENAMID oppure METRAFENONE (con limite massimo trattamenti/anno per bupimirate e metrafenone 3, per cyflufenamid 2) oppure AZOXISTROBIN, TRIFLOXISTROBIN, PIRACLOSTROBYN (tutti famiglia QOI, assieme agli antiperonosporici fenamidone e famoxadone: max 3 trattamenti/anno nel complesso) oppure SPIROXAMINA (3 trattamenti/anno massimo) trascorsi non più di 10-12 giorni dal precedente trattamento ed orientativamente **tra venerdì 23 e sabato 24 giugno**.

In caso di intervalli più lunghi (non consigliati!) rinforzare la protezione antioidica distribuendo ZOLFO IN POLVERE

PERONOSPORA

In funzione del passaggio temporalesco previsto da lunedì, è opportuno associare prodotti di copertura RAMEICI eventualmente associati a principi attivi sistemici a base di FOSETYL-AL oppure FOSFITI DI POTASSIO (5 trattamenti/max), oppure DIFOSFONATO DISODICO (6 trattamenti/max) in grado di proteggere le femmine.

Nei vigneti più vigorosi/soggetti ad attacchi tardivi possibile ricorrere a formulati a base di ZOXAMIDE+RAME (4 trattamenti/max)

TIGNOLE DELLA VITE

Il volo della seconda generazione di tignoletta, con ampio anticipo, è prossimo al picco nelle zone più precoci, pertanto nei vigneti dove si siano già osservati gromeruli fiorali, ed in presenza di catture nelle trappole, confermate da riscontro visivo delle ovideposizioni, è opportuno posizionare a breve prodotti a base di: CHLORANTRANILPROLE (coragen), nel prodotto Luzindo è in miscela con THIAMETHOXAM che ha efficacia anche contro Scafoideo. Vedere a tal proposito bollettino specifico per il posizionamento all'inizio del periodo indicato) o METOXIFENOZIDE (Prodigy, Intrepid).

Per ben valutare posizionamento/prodotto più efficace, contattare il servizio tecnico.

SCAPHOIDEUS TITANUS, vettore della FLAVESCENZA DORATA

PRIMO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO
CONSULTARE L'APPOSITO BOLLETTINO