

**Info n. 02**  
**Del 29/03/2018**



Coordinamento Tecnici di base

## AGGIORNAMENTO TECNICO


**Cocciniglia: trattare**

**Batteriosi: Intervenire con prodotti rameici**

L'evoluzione meteo nel breve periodo segna possibili piogge tra le giornate di venerdì e sabato e poi tempo soleggiato a partire da domenica di Pasqua.

## Cocciniglia (*Eulecanium coryli*)

I rilievi eseguiti in questi giorni dai tecnici dell'assistenza tecnica evidenziano presenza di neanidi sui rametti (foto 1). Fenologicamente ci troviamo in fase di rottura gemme e pertanto nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, dovrà essere fatto l'intervento di contenimento impiegando:



EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g- mL/hL	DOSE kg- L/ha	CAREN ZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
ROTTURA GEMME (C)	COCCINIGLIA DEL NOCCIOLO, ERIOFIDE GALLIGENO	OLIO MINERALE + ZOLFO	POLITHIOL	5000 - 6000	50 - 60	20	Su nocciolo trattare entro la fase di terza foglia. <b>SOGLIA Cocciniglia del nocciolo:</b> presenza di neanidi sui rami di 1-3 anni. <b>SOGLIA Eriofide galligeno:</b> 10% gemme "gallate" (impianti in allevamento); 15% gemme "gallate" (impianti in produzione).

## Necrosi Batterica nocciolo (*Xanthomonas campestris pv corylina*)

In base ai risultati ottenuti nella prova biennale condotta da Agrion si è stabilito che il trattamento primaverile, in fase di rottura gemme, è utile nel contenimento del patogeno. Pertanto si consiglia di intervenire con :

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g- mL/hL	DOSE kg- L/ha	CAREN ZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
ROTTURA GEMME (C)	BATTERIOSI, CITOSPORA E MALATTIE DEL LEGNO	RAMEICI (1)	VARIE	135 - 1250	1,35 - 12,5	20	Trattamento alternativo all'acibenzolar - s - methyl. In presenza di forte attacco autunnale eseguire 2 interventi a dosaggio minimo di etichetta: primo intervento a germogliamento (prima foglia distesa); il secondo dopo circa venti giorni (Epoca di intervento: D1). (1) <b>LIMITARE a 6 kg l'impiego annuo di sostanza attiva.</b>