



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A :

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

**CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE**

**AVVISO N° 3
DEL
11.05.18**

PERONOSPORA

RISCHIO POTENZIALE MOLTO ELEVATO IN RELAZIONE AGLI APPORTI DI PIOGGIA PRESSOCHE' QUOTIDIANI E SOPRATTUTTO AL PASSAGGIO TEMPORALESCO ANCORA INTENSO ATTESO TRA DOMENICA E LUNEDI. LA DISTRIBUZIONE DELLE PIOGGE E LA DIVERSA OPERATIVITA' DEGLI INTERVENTI PRECEDENTI, RENDONO DIFFICILE UNA GENERALIZZAZIONE DELLA LINEA GUIDA PER IL PROSSIMO INTERVENTO. IN OGNI CASO

SI CONSIGLIA ASSOLUTAMENTE DI GARANTIRE UNA CONDIZIONE DI PROTEZIONE PIENA DELLA VEGETAZIONE SUI TEMPORALI PREVISTI PER IL 13-14 RIPRISTINANDO LA COPERTURA AL TERMINE DEL PERIODO Più BREVE DI EFFICACIA DEL PRECEDENTE TRATTAMENTO FINO AD ANTICIPARLO,
SE QUESTO DOVESSE COINCIDERE PROPRIO CON I DUE GIORNI INDICATI, VISTO ANCHE L'EFFETTO DILAVANTE DELLE PIOGGE CADUTE E DELLA VELOCITÀ ESTREMA CON LA QUALE CI SI AVVICINA AL PERIODO SENSIBILISSIMO DELLA PRE-FIORITURA. ORIENTATIVAMENTE L'INTERVENTO SI COLLOCA TRA SABATO 12 E MERCOLEDI 16.5

Si consiglia di utilizzare formulati commerciali a base di

AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI POTASSIO (CON AMETOCTRADINA MAX 3 TRATTAMENTI/ANNO) oppure METALAXIL/ METALAXIL-M/BENALAXIL- BENALAXIL-M (gruppo FENILAMMIDI: MAX 3 TRATTAMENTI ANNO MA UNO SOLO CON METALAXIL) oppure

FLUOPICOLIDE+FOSETYL-AL+partner di copertura (CON FLUOPICOLIDE MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO) oppure, - PREFERIBILMENTE SE L'INTERVENTO DOVESSE CADERE DOPO LE PIOGGE- ripetere

(RAME) ZOXAMIDE o METIRAM o PROPINEB o DITHIANON o MANCOZEB o FOLPET **IN MISCELA CON UNO A SCELTA DEI SEGUENTI P.A.:** DIMETOMORF, IPROVALICARB, MANDIPROPAMIDE, BENTIAVALICARB VALIFENALATE. TUTTI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DEI CAA (MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI MA MAX 3 DI FILA. IL QUARTO EVENTUALE DEVE ESSERE INTERVALLATO CON PA DI DIVERSA FAMIGLIA

OIDIO

Associare, a seconda della criticità del vigneto/zona, attacchi, formulati a base di SPIROXAMINA (MAX 3 TRATTAMENTI/ANNO)

METPIL-DINOCAP (MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO) oppure uno dei seguenti p.a appartenenti alla famiglia degli IBE: Fenbuconazolo, Penconazolo o Tetraconazolo oppure,

ciproconazolo, difenoconazolo, flutriafol, miclobutanil propiconazolo, tebuconazolo

Attenzione!!! La limitazione per gli IBE, nel complesso é di **3 trattamenti/anno** ma è consentito l'impiego per **UN solo trattamento l'anno, DI UNO SOLO degli ultimi 6 riportati in grassetto.**

L'associazione di questi ultimi -se non già in formulazione combi- con ZOLFO BAGNABILE è ottima cosa anche in ottica di strategia antiresistenza

In ogni caso di dubbio, vista la complessità operativa, contattare il proprio tecnico per ulteriori indicazioni