



FEDERAZIONE COLTIVATORI  
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A:

## **DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA**

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELL'OPERAZIONE 10.1.1 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA

**LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE**

**AVVISO N° 12**

**31.07.18**

INVAIATURA IN PROGRESSO CON INQUADRAMENTO PRECOCE (RISPETTO ALLA MEDIA Più RECENTE), SORPRENDENTE PER CERTI VERSI, SE RELAZIONATO ALL'ANDAMENTO METEO DECISAMENTE POCO FAVOREVOLE FINO A META' LUGLIO. L'AVVIO DI AGOSTO CALDISSIMO CHE SI PROSPETTA (MA NON ESENTE DA PASSAGGI INSTABILI Già DA INIZIO SETTIMANA PROSSIMA) NE SOSTERRA' IL COMPLETAMENTO RAPIDO. SI OSSERVA GENERALMENTE UN **CARICO PRODUTTIVO ELEVATO** (SALVO POSIZIONI SOMMITALI CHE HANNO SOFFERTO LA SCARSITA' IDRICA NEL 2017) ONDE SI RACCOMANDA DI PROCEDERE CON L'EVENTUALE INTERVENTO DI **DIRADAMENTO DEI GRAPPOLI** IN FUNZIONE DELL'OBIETTIVO ENOLOGICO.

### **PERONOSPORA**

**OCCORRE PRESERVARE LE FEMMINELLE INDISPENSABILI PER SOSTENERE IL PROCESSO DI MATURAZIONE.**

PER CUI SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN NUOVO TRATTAMENTO TRASCORSI NON Più DI 10 GIORNI DAL PRECEDENTE, ORIENTATIVAMENTE TRA IL 2 ED IL 4 AGOSTO.

UTILIZZANDO FORMULATI RAMEICI\* A MAGGIOR PERSISTENZA (Ossicloruro/Solfato tribasico)

**\*PRODOTTI RAMEICI: APPORTO MASSIMO DI 6 KG/HA/ANNUO DI RAME METALLO (IN MEDIA RAPPRESENTA IL 20-25% DEL PESO DEL PRODOTTO USATO)**

### **OIDIO**

NEI vigneti/vitigni senza problematiche ricorrere a ZOLFO BAGNABILE. Utile in strategia anticbotrica valutare il ricorso a zeoliti, bentoniti e bicarbonato di potassio (CONSULTARE IL PROPRIO TECNICO). Utilizzare bassi dosaggi di etichetta, come **ULTIMO TRATTAMENTO** per i bianchi e per i rossi precoci che mostrano un grado avanzato di invaiatura

### **BOTRITE:**

**ATTENZIONE!!! Si RIBASICE CHE L'ANNATA è' PREDISPONENTE (NON SI DIMENTICHI LA PIOVOSITÀ DURANTE LA FIORITURA)**

**SI CONSIGLIA DI VALUTARE L'INTERVENTO POSIZIONATO AL TERMINE DELL'INVAIATURA, COMPLETANDO LA LINEA PREVENTIVA SUGGERITA (FASCIA GRAPPOLI PREVENTIVAMENTE SFOGLIATA)**

**NB SONO AMMESSI AL MASSIMO DUE TRATTAMENTI ANTIBOTRITICI, DUNQUE SE GIÀ FATTO UN ANTIBOTRITICO DI PRE.CHIUSURA, UTILIZZARE UN PRODOTTO DIVERSO**

VALTURE ATTENTAMENTE IL POSIZIONAMENTO CON PRODOTTI AVENTI 21 GG DI CARENZA

%% PIRIMETANIL %% CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (o anche da soli) (UN SOLO TRATTAMENTO COMPLESSIVO)

OPPURE 14 GG CARENZA, \*\*\* FENPYRAZAMINE OPPURE

EUGENOLO+GERANIOLO+TIMOLO (3GG)

IN AGGIUNTA, **IN CASO DI ANDAMENTO METEO CRITICO, IN PROSSIMITÀ DELLA VENDEMMIA, SI POSSONO UTILIZZARE I SEGUENTI PRODOTTI "BIOLOGICI" COADIUVANTI CON CARENZE BREVISSIME (IN PARENTESI)**

BICARBONATO DI POTASSIO: 1GG); *BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS*(:3GG), *BACILLUS SUBTILIS* (: 3 GG); *Pythium oligandrum* (NP)  
CONSULTARE IL PROPRIO TECNICO PER CONCORDARE L'EVENTUALE INTERVENTO

**SECONDO TRATTAMENTO OBBLIGATORIO FLAVESCENZA DORATA**  
**VEDERE LE INDICAZIONI RIPORTATE NELL'APPOSITO BOLLETTINO**