



FEDERAZIONE COLTIVATORI  
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A:

## DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA  
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

**AVVISO N° 8**  
**12 giugno 2020**

### PERONOSPORA. DIFFUSIONE VARIABILE/RISCHIO ANCORA ELEVATO

Presenza di macchie del patogeno diffusa, seppur con intensità medio-bassa, ma in aumento. Sporadici attacchi a carico dei grappoli. Significativo incremento della sporulazione delle macchie, legata al contesto temporalesco iniziato all'esordio del mese e tutt'ora in corso. Episodi di grandine frequenti con danni anche intensi ma relativamente localizzati. Si prospetta un'ulteriore ondata temporalesca attualmente indicata da martedì/mercoledì 17 per i successivi 3 giorni almeno. Ove ci fossero macchie vitali (situazioni di bassa collina/vigneti vigorosi) l'evento rappresenta - **in prospettiva- ancora un fattore di rischio MOLTO elevato** per la possibilità di evoluzione di attacchi sui grappoli in forma 'larvata'. Si consiglia, pertanto, di mantenere la copertura serrata dei vigneti.

### EFFETTUANDO UN NUOVO TRATTAMENTO

Rispettando gli intervalli più corti di efficacia del precedente (9-12 giorni)

*Attenzione, contemplare, nel conteggio, l'impossibilità di rispettarli con il perdurare delle nuove piogge previste. Nelle situazioni più critiche si raccomanda pertanto l'anticipo rispetto all'esordio delle stesse.*

**Utilizzare, RISPETTANDO I LIMITI EVIDENZIATI, E A SECONDA DELLA FENOLOGIA:**

\*FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): BENALAXYL (3MAX), BENALAXYL-M (3MAX), METALAXYL-M (3MAX), ASSOCIATI A

\*FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI O 'NON RAMEICI' (4\*\*\* TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): MANCOZEB (3 MAX FINO ALLEGAGIONE), DITHIANON (3 MAX FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM (3 MAX FINO ALLEGAGIONE) FOLPET (3MAX). OPPURE METIRAM (3 MAX SE DA SOLO - MA FINO ALL'ALLEGAGIONE)

OPPURE LE STESSA SA DI COPERTURA ASSOCIATE A OXATHIPIPROLIN (2MAX) ANCHE CON ZOAXAMIDE(4MAX)  
OPPURE

AMETOCRATIDINA (QoSi) (3MAX) (ANCHE CON FOSFITO DI POTASSIO)

SI RICORDA IL LIMITE MASSIMO DI 8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI NEL GRUPPO DEI RINFORZANTI SISTEMICI: FOSFO.TO DI DISODIO: 6MAX, FOSFO.TO DI POTASSIO: 5MAX, FOSETYL ALLUMINIO SL

### OIDIO. RISCONTRI DEL PATOGENO IN AUMENTO SU BACCHE SVILUPPATE

PROSEGUIRE CON il ricorso ALTERNATO tra

\*FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO ANCHE CON ANTIPERONOSPORICO FAMOXADONE): AZOXY-TRIFLOXY-PYRACLO-STROBIN (TUTTI 3MAX)

OPPURE

\*FAMIGLIA/GRUPPO: CMR (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): PROQUINAZID (2MAX), BUPIMIRATE (2MAX), PYRIOFENONE (2MAX E 3 COMPLESSIVAMENTE CON METRAFENONE)

\*FAMIGLIA/GRUPPO: ARYL-FENIL-CHETONI (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): METRAFENONE (3MAX); PYRIOFENONE (2MAX)

\*FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): FLUXAPIROXAD (2MAX); BOSCALID (1 trattamento max) quest'ultimo molto indicato in pre.chiusura con target anche antibotritico

Oppure CILFLUFENAMID (2 trattamenti MAX/anno)

\*FAMIGLIA/GRUPPO: IBE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL.DIFEN/TEBU/CONAZOLO (TUTTI 1 MAX) TETRA/FENBU/PEN/CONAZOLO (TUTTI 3 MAX)

Tra i prodotti complementari biologici: CEREVISANE (SL), LAMINARINA (SL), COS-OGA(SL), OLIO DI ARANCIO DOLCE (SL), BACILLUS PUMILUS

### TRATTAMENTO INSETTICIDA PER FLAVESCENZA DORATA:

### NON è ANCORA IL MOMENTO! ATTENDERE APPOSITO COMUNICATO SPECIFICO

SI RICORDA CHE L'OBBLIGO DI SFALCIO ERBA A FILARI ALTERNI VIENE MENO NEL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEL TRATT.TO INSETTICIDA V=SCAFOIDEO CHE RENDE INVECE OBBLIGATORIO LO SFALCIO SIMULTANEO DI TUTTI I FILARI PER TUTELARE I PRONUBI

In caso di dubbio e.o per eventuali INTERVENTI SPECIFICI ANTIBOTRITICI, anche con innovativi agenti attivi biostimolanti/multitarget

\*\*\*contattare il proprio tecnico per ulteriori indicazioni e valutazioni