



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A :

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

AVVISO N° 9
26 giugno 2020

PERONOSPORA

DIFFUSIONE NON TRASCURABILE. RISCHIO DISCRETO

Il riscontro di nuove macchie (con scarsa sporulazione) del patogeno soprattutto nei fondovalle/vigneti più vigorosi è stato frequente, assieme a sporadici attacchi a carico dei grappoli, a riprova di una pressione non trascurabile del patogeno. La fenologia generalmente anticipata, con la prospettiva di un'altra settimana ad alte temperature ed insolazione, consente di valutare comunque poco probabile una progressione di attacchi sui grappoli in forma 'larvata' percentualmente importante. Resta priorità assoluta comunque limitare la diffusione a livello della vegetazione apicale. Previsioni a medio termine inquadrano attualmente come poco piovosa la prima metà di luglio.

EFFETTUARE UN NUOVO TRATTAMENTO

rispettando gli intervalli più lunghi di efficacia del precedente
orientativamente tra lunedì 29.6 e mercoledì 1.7

Utilizzare, **RISPETTANDO I LIMITI EVIDENZIATI**: *FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI (max 4 kg/ha/anno di rame metallo).

Nelle situazioni più problematiche possibile associare ai rameici ZOXAMIDE(4MAX), oppure AMISULBROM

oppure ricorrere a

CIAZOFAMIDE + FOSFONATO di diNa (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI MASSIMI NEL GRUPPO Qi: AMISULBROM+CIAZOFAMIDE)

OPPURE RAME + RINFORZANTI SISTEMICI. DEI QUALI SI RICORDA IL LIMITE MASSIMO DI 8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI: FOSFO.TO DI DISODIO: 6MAX, FOSFO.TO DI POTASSIO: 5MAX, FOSETYL ALLUMINIO SL

OIDIO

RISCONTRI DEL PATOGENO IN AUMENTO SU GRAPPOLI IN SVILUPPO AVANZATO

L'INTERVALLAMENTO -TRA TURNI DI DISTRIBUZIONE DEI TRATTAMENTI LIQUIDI- CON 'PONTI' DI ZOLFO POLVERULENTO (25-30 KG/HA) è SEMPRE COSA UTILE E RACCOMANDABILE IN CASO DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE/PRESENZA DEL PATOGENO.

IN SITUAZIONI NON PROBLEMATICHE ASSOCIARE ZOLFO BAGNABILE A DOSAGGI MEDI DI ETICHETTA.

Tra i prodotti complementari biologici si ricordano : CEREVISANE (SL) , LAMINARINA (SL), COS-OGA(SL), OLIO DI ARANCIO DOLCE (SL), BACILLUS PUMILUS, BICARBONATO DI POTASSIO.

Nelle situazioni più problematiche proseguire con ricorso ALTERNATO preferibilmente a

*FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO ANCHE CON ANTIPERONOSPORICO FAMOXADONE) : AZOXY-TRIFLOXY-PYRACLO-STROBIN (TUTTI 3MAX)

OPPURE

*FAMIGLIA/GRUPPO: CMR (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): PROQUINAZID (2MAX), PYRIOFENONE (2MAX E 3 COMPLESSIVAMENTE CON METRAFENONE

*FAMIGLIA/GRUPPO: ARYL-FENIL-CHETONI (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : METRAFENONE (3MAX); PYRIOFENONE (2MAX)

in pre.chiusura con target anche antibotritico molto indicato BOSCALID (1 trattamento max) *FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO TRA BOSCALID E FLUXAPIROXAD

Oppure CILFLUFENAMID(2 trattamenti MAX/anno)

1^ TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER FLAVESCENZA DORATA: **VEDERE APPOSITO COMUNICATO (ANCHE PER TIGNOLE)**

SI RICORDA A TUTTE LE AZIENDE CHE L'OBBLIGO DI SFALCIO ERBA A FILARI ALTERNI VIENE MENO NEL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO INSETTICIDA CONTRO SCAFOIDEO CHE LO RENDE INVECE OBBLIGATORIO SIMULTANEAMENTE SU TUTTI I FILARI PER TUTELARE I PRONUBI

Contattare sempre il proprio tecnico per ulteriori indicazioni e valutazioni