



FEDERAZIONE COLTIVATORI  
DIRETTI CUNEO



UNIONE PROVINCIALE  
AGRICOLTORI CUNEO

COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA:  
**DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA**  
(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE OP.NE 10.1.1 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA  
LANGHE, ROERO

Avviso N° 9bis  
DEL 26/6/20

**Flavescenza dorata della vite si previene solo se:  
dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore) si estirpano le piante malate e si eliminano i tralci  
con sintomi: questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).**

**Il primo trattamento obbligatorio per le aziende convenzionali**

**dovrà essere effettuato tra il 1luglio ed il 5 luglio\***

CON UNO DEI SEGUENTI INSETTICIDI CONSIGLIATI ORA (preferibili in grassetto)

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
<b>Acetamiprid</b>	Neonicotinoidi	7-14
<b>Flupyradifurone*</b>	Butenolidi	14
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	21
Acrinatrina	Piretroidi	30
Tau-fluvalinate	Piretroidi	21

\*Trattare nei primi giorni del periodo previsto nelle zone più precoci, UTILIZZANDO PREFERIBILMENTE, in questa fase, LE SA in grassetto in assenza di tignole.

VERIFICARE EVENTUALI DATE SPECIFICHE PER COMUNI RIENTRANTI IN PROGETTI PILOTA

**NOTA AGGIUNTIVA PER LE TIGNOLE**

IN caso di accertato picco di volo meglio utilizzare tempestivamente p.a **specifici** (no target vs scafoideo) ovo-larvicidi (METOSSIFENOZIDE (esclusivamente contro tignoletta) E TEBUFENOZIDE, CHLORANTRANILIPROLE oppure con più margine EMAMECTINA BENZOATO. Posizionare successivamente l'intervento v/scafoideo preferibilmente con flupyradifurone(\*) al termine del periodo indicato.

**Salvaguardia degli insetti pronubi**(Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

**ACCORDIMENTI** Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.

- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.

**VIGNETI ADIACENTI AD AREE FREQUENTATE DA GRUPPI VULNERABILI**

(punto A.5.6 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Nei vigneti a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- \*Distribuire la miscela verso l'interno del vigneto \*Utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica
- trattare nelle ore di minor frequentazione.