



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A:

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

AVVISO N° 13
05 agosto 2020

L'invasione prosegue regolarmente e attualmente previsioni di medio termine (con relativa affidabilità) indicano un proseguimento del regime meteorologico, almeno fino alla II decade del mese, sostanzialmente caldo e poco piovoso. Conseguentemente ci si attende una rapida progressione della fase iniziale di maturazione. Si è osservata altresì una grande variabilità anche intra-varietale nell'avvio della stessa legata a posizione/carico produttivo in primis ma anche ad altri fattori agronomici. Sarà questo un elemento chiave da considerare per la valorizzazione della vendemmia.

PERONOSPORA

Nei vigneti più soggetti a bagnature e/o vigorose la diffusione di macchie vitali sulla parte neo-formata della vegetazione risulta tutt'ora di difficile controllo. **In tali situazioni pertanto si consiglia di**

MANTENERE LA COPERTURA DEI VIGNETI, RIPRISTINANDOLA DOPO EVENTUALI TEMPORALI O ACCUMULI CONSISTENTI (30-40 mm) o comunque trascorsi non più di 11-13 giorni dal precedente trattamento. Per i rossi a maturazione tardiva almeno fino a fine mese.

Utilizzare, **RISPETTANDO I LIMITI EVIDENZIATI: *FAMIGLIA/GRUPPO:**

COPERTURA RAMEICI ** (SI RICORDA IL LIMITE: Al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno).

OIDIO

Si ricorda che il compimento dell'invasione riduce il rischio per questo patogeno. Si consiglia di associare esclusivamente ZOLFO BAGNABILE (con dosaggio modulato, in funzione della pressione, fino alla sospensione totale nei vigneti indenni) E' ovviamente consigliato la sospensione dei trattamenti per vitigni a maturazione precoce. In caso di necessità meglio ricorrere, tra i prodotti complementari biologici: LAMINARINA (SL), COS-OGA(SL), OLIO DI ARANCIO DOLCE (SL), BICARBONATO DI POTASSIO

BOTRITE (MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO****)

Ricordiamo un andamento generalmente predisponente dell'annata verso questo patogeno. In particolare il rischio è più alto nei vigneti che abbiamo subito danni da grandine, e/o molto vigorosi. L'invasione resta una fase fenologica chiave per l'intervento preventivo. Trattamenti (esclusivamente) a ridosso della vendemmia rischiano di avere efficacia molto ridotta. Perciò **Si consiglia di valutare con il proprio tecnico** il posizionamento di uno specifico prodotto anti-botritico (previa fondamentale sfogliatura) a scelta tra:

%% PIRIMETANIL %% CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (o anche da soli) (21 gg di carenza) (UN SOLO TRATTAMENTO

COMPLESSIVO) OPPURE,

*** FENPYRAZAMINE o FENEXAMIDE (14-7 GG CARENZA RISPETT. TE UN SOLO TRATTAMENTO COMPLESSIVO)

ISOFETAMID (NUOVO). ATTENZIONE: 1 TRATTAMENTO MAX COMPLESSIVO NEL GRUPPO SDHI CON BOSCALID E FLUXAPIROXAD.

******IN AGGIUNTA AI 2 TRATTAMENTI SOPRA INDICATI SI POTRANNO UTILIZZARE, ESSENDO PRODOTTI AMMESSI IN DIFESA BIOLOGICA AD ESSA:**

- EUGENOLO-TIMOLO-GERANIOLO (4 tratt. MAX/anno)
- PYTHIUM OLIGANDRUM POLYVERSUM (4 tratt. MAX/anno)
- CEREVISANE
- BACILLUS SUBTILIS -B. AMYLOLIQUEFACIENS -AUREOBASIDIUM PULLULANS
- (BICARBONATO DI POTASSIO, CEREVISANE)