

Info n. 12

Del 05/05/21

NOCCIOLO



Coordinamento corilicolo Piemontese

Aggiornamento

Eriofide: migrazione in corso in zone tardive

Cocciniglia: segnalata presenza


Necrosi batterica: interventi di stagione

Aggiornamento scatole svernamento cimice asiatica


Tutela dei pronubi

La scorsa settimana è trascorsa ancora all'insegna del tempo perturbato e delle temperature non elevate, ma per questa è prevista alta pressione sulle regioni alpine che sarà nuovamente scalfita da correnti occidentali più umide associate a una depressione centrata sul Nord Europa. Nella parte sud delle Alpi si avranno passaggi nuvolosi mentre sull'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta si verificheranno alcune piogge a tratti.

Nel grafico la situazione meteo registrata dalla stazione di Cravanzana (T Min, Media e Max e Precipitazioni in mm) dell'ultima settimana (Fonte: Servizio Meteo 3aCloud).



Nel grafico sottostante il confronto tra il mese di aprile 2020 e il mese di aprile 2021 sempre per la stazione di Cravanzana.



La temperatura minima segnalata, a parte l'evento gelata tra il 7 e 8 aprile 2021 è stata inferiore per tutto il mese rispetto a quella registrata nel 2020 mentre le precipitazioni sono state più contenute.

ERIOFIDE: MIGRAZIONE IN CORSO IN ZONE TARDIVE

I controlli in campo di inizio settimana evidenziano la presenza di forme mobili dell'acaro in fase di migrazione in alcune aree più tardive. Si consiglia **entro fine di questa settimana** di ripetere l'intervento con la s.a. zolfo nelle zone dove fosse stato effettuato un solo intervento (vedi info nocciolo 11).



COCCINIGLIA DEL NOCCIOLO: SEGNALATA PRESENZA

Segnalata presenza di femmine in fase di ovideposizione della cocciniglia *Eulecanium coryli*. In generale si consiglia di intervenire nella fase autunnale/invernale prima della ripresa vegetativa, ma nel caso si trovassero infestazioni considerevoli in questa stagione occorre concordare con il tecnico la strategia da applicare per la difesa. Nel cerchio rosso le femmine fecondate rinvenute sui rametti di nocciolo.



NECROSI BATTERICA: GLI INTERVENTI DI STAGIONE

Per chi non fosse ancora riuscito ad effettuare l'intervento primaverile si consiglia, nelle zone ove negli anni precedenti siano stati segnalati infezioni batteriche provocate da *Xanthomonas arboricola pv corylina*, di effettuare un trattamento con la s.a. rame a dose minima di etichetta. (Formulati a base di rame : **al massimo 12 kg/ha di s.a. nel triennio 2019-2021 e comunque non più di 5 kg/ha in un anno**).

AGGIORNAMENTO SCATOLE SVERNAMENTO CIMICE ASIATICA

Le indicazioni provenienti dalle postazioni / teche di svernamento, indicano complessivamente, nella diciottesima settimana (**03/05/2021-09/05/2021**), una **fuoriuscita di adulti di cimice asiatica** pari al 32,48%.

TUTELA DEI PRONUBI

Nel caso del nocciolo con fioritura invernale occorre fare attenzione ai trattamenti effettuati in primavera in concomitanza con la fioritura di altre colture (es. *Tarassacum officinalis*, *Lamium purpurea* ecc.).

Alcune indicazioni utili a protezione dei pronubi prima di procedere con la distribuzione del prodotto fitosanitario:

- sfalciare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale per evitare che le api siano attratte da fioriture di erbe spontanee;
- effettuare trattamenti evitando le ore centrali del giorno in cui le api sono in attività e operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al momento della distribuzione;
- impiegare, se possibile, sostanze attive meno tossiche per combattere l'avversità.

