

5

Comunicato Per La Difesa In Viticoltura Difesa Integrata Volontaria VITE

5

VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10.1.1 DEL PSR

CentroAssistenzaTecnica LANGHE ROERO DOGLIANI MONREGALESE
2021 Del 7 GIUGNO ore 8.30 2021

Situazione

Fase fenologica molto disomogena a seconda dei vitigni/zone. Si va da inizio fioritura (BBCH 61) a (rari casi) di allegagione avvenuta(BBCH 72) dei nebbioli di siti meglio esposti. Attualmente il ritardo è stimabile in 8 gg rispetto media storica di riferimento più recente. Questa settimana prevista temporalesca con possibili ampie finestre asciutte da valutare. PRESSIONE DEI PATOGENI DIVENUTA DISCRETA IN GENERALE

PERONOSPORA. Plasmopara viticola.

SI CONSIGLIA NUOVO INTERVENTO **DA OGGI ED ENTRO MERCOLEDI 9 GIUGNO (TRASCORSI 9-10 GG MAX DAL PRECEDENTE)** (VISTO IL RAPIDO SVILUPPO VEGETATIVO) UTILIZZANDO FORM.TI COMM.LI CONTENENTI: ***FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA** (4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/(ANNO) : MANCOZEB (3 TRATT. MAX FINO ALLEGAGIONE), DITHIANON (3 TRATT. MAX FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM (3 TRATT. MAX) FOLPET (3 TRATT. MAX). METIRAM(3 TRATT. MAX SE DA SOLO, FINO ALL'ALLEGAGIONE). **IN ASSOCIAZIONE A : INDUTTORI SISTEMICI** (8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX), FOSFONATO DI DISODIO (6MAX). **OPPURE A AMETOCTRADINA** (QoS) (3 TRATT/MAX) **OPPURE A FLUOPICOLIDE**(2 TRATT/MAX) **OPPURE A *FAMIGLIA/GRUPPO: Qii** (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : AMISULBROM (3MAX), CIAZOFAMIDE+ (3MAX) **OPPURE A *FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI** (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : BENALAXYL (3MAX),BENALAXYL-M (3MAX),METALAXYL-M (3MAX), POSSIBILE RICORSO ANCHE ALLE RECENTI MISCELE **OXATHIPIPROLIN** (2 TRATT/MAX) + **ZOXAMIDE** (O FOLPET). ZOXAMIDE (MAX 4 TRATT/COMPLESSIVI) PUO' ESSERE UTILIZZATA IN TUTTI I F.C CHE LA CONTENGONO IN ASSOCIAZIONE AD ALTRE I SA PARTNERS.

IN CASO DI PRESENZA IMPORTANTE DI MACCHIE E/O INTERVENTALLI PIÙ AMPI RISPETTO ALLE TEMPSTICHE INDICATE POSSIBILE RICORRERE A DIVERSE FORMULAZIONI DELLA ***FAMIGLIA/GRUPPO: CAA** (4 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO. DOPO 3 UTILIZZI -EVENTUALI CONSECUTIVI-,OBBLIGO DI ALTERNARE UNA SA DI GRUPPO DIVERSO): DIMETOMORF (4MAX), IPROVALICARB(4MAX), MANDIPROPAMIDE(4MAX), VALIFENALATE(4MAX), BENTHIAVALICARB(2MAX)

OIDIO. Uncinula necator.

Se non già utilizzati due volte nei precedenti (in tal caso meglio alternare prima del 3^ eventuale utilizzo) ricorrere a form.ti comm. contenenti : ***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE** (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) :

ATTENZIONE TRA ESSI: FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL-DIFEN/TEBU/CONAZOLO (TUTTI 1 trattamento/MASSIMO/ANNO). mentre: FENBU/PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 TRATTAMENTI/MAX/ANNO). Associare ad essi ZOLFO BAGNABILE (SE NON GIÀ FORM.NE COMBI)IN CHIAVE ANTIRESTENZA. oppure: **CIFLUFENAMID**(2 TRATT/MAX) **O SPIROXAMINA** (3 TRATT/MAX) **O *FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI** (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : **FLUXAPIROXAD** (2MAX); BOSCALID (1 TRATT/MAX MEGLIO DA RISERVARE IN FASE DI PRE.CHIUSURA). **OPPURE INFINE UTILI IN CHIAVE COLLATERALE ANTIBOTRITICA/BLACK ROT:FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE** (3 TRATT. COMPLESS./MAX/ANNO ANCHE CON ANTIPERONOSPORICO FAMOXADONE) : AZOXY(2!)TRIFLOXY(3)PYRACLO(3)-STROBIN (TRATT/MAX)

ATTENZIONE ESTREMA. **TUTELA APISTICA** : La Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, prevede:

"Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, **sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api ... durante il periodo di fioritura**, altresì vietati tali tratt. se sono presenti secrezioni nettariifere extraforali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api". PERTANTO OCCORRE VERIFICARE ATTENTAMENTE EVENTUALI INDICAZIONI DI TOSSICITA' IN MERITO RIPORTATE IN ETICHETTA

ATTENZIONE ALLA NUOVA DICITURA RIPORTATA NELLA PARTE GENERALE DELLE NORME TECNICHE DI DIFESA VITE:

Nelle miscele estemporanee di fungicidi (compreso combi pack) non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, lo zolfo, i Fosfonati di K, il Fosfonato di disodio, il Fosetil Al e tutti i prodotti biologici.

CONSULTARE IL PROPRIO TECNICO PER ULTERIORI VALUTAZIONI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE