

Info n. 22

Del 28/07/21

NOCCIOLO



Coordinamento corilicolo Piemontese


Aggiornamento

Aggiornamento fasi fenologiche e operazioni pre raccolta

Cimici del nocciolo: i rilievi in campo


La settimana in corso è ancora caratterizzata da instabilità con frequenti **passaggi temporaleschi**, anche di forte intensità, soprattutto verso il Nord-Ovest. Nella parte centrale della settimana ci sarà una parentesi più stabile, ma da venerdì si ripresenterà l'instabilità temporalesca.

In figura è rappresato il grafico dei dati meteo rilevati dalla stazione di **Cravanzana (CN) dal 21 al 27 luglio**. In evidenza l'**assenza di precipitazioni**, la ventosità sempre presente e le **T Max quasi sempre superiori ai 30° C**



(Fonte: Servizio Meteo GreenPlanet 3 A).

Nel grafico sotto il riepilogo della temperatura (T Media °C) e della piovosità (mm) del periodo gennaio-luglio 2020/2021 per la stazione di Cravanzana (CN) (Fonte: Servizio Meteo Green Planet 3A).



Dal confronto (anche se i dati di luglio 2021 sono aggiornati alla data del 27/07) emerge come nei mesi di aprile, maggio, giugno e anche luglio sia complessivamente piovuto meno rispetto al 2020 ed anche come la T media, sia stata inferiore nel 2021 fino a giugno rispetto all'anno precedente.

AGGIORNAMENTO FASI FENOLOGICHE e OPERAZIONI PRE RACCOLTA

Lo sviluppo del seme risulta ben formato con completo riempimento della cavità interna del guscio.



In tabella le previsioni di inizio raccolta per la stagione e il confronto con quelle 2020.

ZONA	PREVISIONI INIZIO RACCOLTA 2020	PREVISIONE INIZIO RACCOLTA 2021
ALESSANDRINO	10 agosto	20 agosto
ASTIGIANO, VALLE BORMIDA	10 agosto	Dal 15-20 agosto
Areali astigiani anticipati (TIGLIOLE, VALLEANDONA ecc.)	--	Prima del 15 agosto
ALTA LANGA	20 agosto	Dopo 20 agosto
ALBESE	17 agosto	Dopo 15 agosto
MONREGALESE	17 agosto	Dopo il 18-20 agosto
CUNEESE	17 agosto	Dopo 15 agosto

In questi giorni le aziende hanno avviato le operazioni preparatorie alla raccolta con la trinciatura dei noccioleti. A questa operazione, potrebbe far seguito, a seconda della gestione aziendale, quella del diserbo (si ricorda che per le aziende aderenti alle **Misure Agroambientali, i Disciplinari di Produzione integrata 2021 prevedono 1 solo intervento di diserbo in pre raccolta con le sostanze attive ammesse**).

Per chi deve effettuare operazioni di spollonatura si ricorda di impiegare esclusivamente principi attivi ad azione spollonante (s.a. **carfentrazone** e s.a. **pyraflufen-etile**) e di intervenire ad uno stadio erbaceo dei polloni (vedi foto).



CIMICI DEL NOCCIOLO: I RILIEVI IN CAMPO

Le catture in trappola sono, in generale, contenute in tutte le zone con lieve aumento di forme giovanili di *Halyomorpha halys*.

Nei frappege la situazione sul territorio risulta molto eterogenea. Si segnalano in alcuni areali presenza di cimice asiatica e di cimici autoctone (*Gonocerus acuteangulatus*, *Palomena prasina* e *Nezara viridula*) in aumento in questi ultimi anni.

In previsione della raccolta che salvo alcune situazioni è prevista a partire dal 15 agosto in poi a seconda dell'areale, **si consiglia di mantenere un monitoraggio attivo** nei propri noccioleti e si raccomanda alle **aziende di contattare il tecnico di riferimento nel caso vi fossero situazioni a rischio per concordare la strategia da seguire in questa fase**.