

**Info Flash n°4**

**Del 26/07/21**

**NOCCIOLO**



**Coordinamento corilicolo Piemontese**

## **Aggiornamento**

**Campionamento cimici: Albese, Roero, Valle Bormida, Valle Belbo e Tinella, Cravanzana, Cortemiliese e zone limitrofe**

**Tutela dei pronubi**

## CAMPIONAMENTI CIMICI: ALBESE, ROERO, VALLE BORMIDA, VALLE BELBO E TINELLA, CRAVANZANA, CORTEMILIESE E ZONE LIMITROFE

I frappege eseguiti nelle prime ore della giornata di oggi indicano che le popolazioni di cimici nei corileti risultano in rapido, progressivo e **generalizzato aumento**.

Vista la fase di particolare sensibilità del seme in accrescimento si consiglia **di effettuare**, in funzione delle previsioni meteo e entro fine di questa settimana, **il secondo intervento insetticida** contro *Halyomorpha halys* e cimici autoctone. Tale trattamento deve essere **concordato con il tecnico di zona** per decidere la strategia di difesa da seguire.

In tabella le sostanze attive utilizzabili per la difesa contro la cimice. In previsione della raccolta si ricorda di **prestare attenzione ai tempi di carenza** delle varie sostanze attive impiegati.

AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
CIMICI (pentatomidi e coreidi)	LAMBDA - CIALOTRINA	KARATE ZEON 1.5 ecc	170	1,7	7	Con i PIRETROIDI al massimo 3 interventi all'anno. ETOFENPROX e LAMBDA-CIALOTRINA al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. ETOFENPROX non rientra nel computo del conteggio di utilizzo di piretroidi
	ETOFENPROX	TREBON UP, SWORD UP	50	0,5 - 0,75	14	
CIMICE ASIATICA	ETOFENPROX	TREBON UP, SWORD UP	50	0,5 - 0,75	14	
	LAMBDA - CIALOTRINA	KARATE ZEON 1.5 ecc	170	1,7	7	
	ACETAMIPRID*	EPIK SL	100 - 150	1,5	14	Al massimo 1 intervento all'anno. La società consiglia di impiegarlo in presenza di forme giovanili
KESTREL		-	0,35 - 0,5	7	Al massimo 2 interventi all'anno	

\* Deroga territoriale (n. 7.60.100, 1/2021A) alle norme tecniche di produzione integrata per l'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l'utilizzo dei formulati Epik SL e Kestrel contenenti la sostanza attiva acetamiprid contro la cimice asiatica *Halyomorpha halys* su nocciolo, come da indicazioni in etichetta

## TUTELA DEI PRONUBI

Si ricorda che gli interventi di difesa fitosanitaria non sono consentiti durante la fioritura delle colture, salvo espressa autorizzazione da parte del Settore Fitosanitario Regionale.

**Pertanto, va considerato con estrema attenzione il fatto che, come nel caso di impiego di insetticidi, anche in caso di trattamenti con diserbanti e/o fungicidi NON SI PUO' OPERARE in presenza di fiori e di melate.**

Alcune indicazioni utili a protezione dei pronubi prima di procedere con la distribuzione del prodotto fitosanitario:

- **sfalciare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale per evitare che le api siano attratte da fioriture di erbe spontanee;**

- **effettuare trattamenti evitando le ore centrali del giorno in cui le api sono in attività e operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al momento della distribuzione;**
- **impiegare, se possibile, sostanze attive meno tossiche per combattere l'avversità.**