



2

Comunicato Per La Difesa In Viticoltura Difesa Integrata Volontaria VITE

2

VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10.1.1 DEL PSR

Centro Assistenza Tecnica

LANGHE

ROERO

DOGLIANI

MONREGALESE

2022

Del

9

Maggio

ore 16

2022

Situazione

Settimana scorsa sono caduti, finalmente, dagli 80 ai 100 mm abbondanti di pioggia, seguiti, dopo breve intervallo, da ulteriori 15-25 nel week-end. Soltanto nelle zone più sudorientali della regione gli apporti in tale ultimo caso sono stati inferiori a 10 mm. Si profila per tutta la settimana tempo stabile.

Ciò consente di **programmare** con maggiore calma il **prossimo trattamento** antiparassitario che non va posizionato subito (fatta salva la copertura antiodica come consigliata nel precedente bollettino nr 1) ma **da giovedì venerdì 12-13 pv** valutando nel frattempo l'evoluzione previsionale meteo*

OIDIO. Uncinula necator !

Permangono condizioni predisponenti. Eventualmente consigliata la distribuzione di Zolfo in polvere in questi giorni ove praticabile.

l'intervento successivo bagnabile si consigliano prodotti a base di ZOLFO ovvero, nelle situazioni più rischiose (vitigno/posizione/presenza di oidio nella scorsa stagione) in crescendo: SPIROXAMINA (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO. -CONSIGLIATO DOPPIO TRATTAMENTO A DOSE CRESCENTE/Ha-)

DINOCAP (MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO).

Utile proseguire con l'aggiunta di prodotti biostimolanti (cerevisane, laminarina ecc) almeno per 3 volte consecutive, anche in funzione antiperonosporica, scegliendo tra quelli bivalenti.

PERONOSPORA. Plasmopara viticola

Non si esclude possano essere partite blande infezioni primarie al termine della settimana scorsa. EFFETTUARE ATTENTO MONITORAGGIO nei posti/vitigni spia a fine settimana. Nelle date indicate (non subito!), si consiglia di associare PRODOTTI RAMEICI a maggiore persistenza (SOLFATO TRIBASICO, OSSICLURURI), ovvero altri prodotti di copertura (METIRAM, DITHIANON, FLUAZINAM) ai dosaggi opportuni per lo sviluppo della vegetazione.

Consigliata l'associazione di CYMOXANIL in rafforzamento preventivo su eventuali successive piogge (attualmente ipotizzate da inizio settimana successiva. Biostimolant come da consiglio nella sezione Oidio.

NOTA BENE

* nel caso si dovesse nel frattempo configurare una previsione di piogge consistenti e prolungate nei 10 giorni successivi al trattamento (con accumuli ipotizzati almeno sui 40 mm) valutare l'aggiunta (alternativa al CYMOXANIL) di un p.a.

appartenente alla ***FAMIGLIA/GRUPPO: CAA** (4 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO. DOPO 3 UTILIZZI -EVENTUALI CONSECUTIVI-, OBBLIGO DI ALTERNARE UNA SA DI GRUPPO DIVERSO): DIMETOMORF (4 T rattamenti/A nno MAX), IPROVALICARB(4 T/A MAX), MANDIPROPAMIDE(4 T/A MAX), VALIFENALATE(4 T/A MAX), BENTHIAVALICARB(2 T/A MAX)

Per questa evenienza consultare il proprio tecnico al momento opportuno

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE