



3

Comunicato Per La Difesa In Viticoltura Difesa Integrata Volontaria VITE

3

VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10.1.1 DEL PSR

Centro Assistenza Tecnica

LANGHE

ROERO

DOGLIANI

MONREGALESE

2022

Del

20

Maggio

ore 16.00

2022

Situazione

Primi segnali di sofferenza idrica in concomitanza delle temperature fuori norma per il periodo intervenute dalla prima decade del mese. Fortissima accelerazione della fenologia verso la fioritura, in esordio su Brachetto, Chardonnay, Moscato, Nebbiolo e Pinot nero dei siti più precoci. Prossima su altri vitigni. Se ne attende un decorso molto rapido. Da Martedì (attualmente) previsto un passaggio temporalesco.

OIDIO. Uncinula necator !

Visto l'imminenza della fioritura è necessario effettuare un trattamento con sa che ne seguano il compimento fino all'allegagione essendo quest'ultimo un momento di assoluta sensibilità della bacca (vista la rapida espansione alla quale andrà in contro) al patogeno. Pertanto si consiglia ricorso a formulati commerciali che contengano, in alternativa tra loro, una delle seguenti s.a.:

***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE** (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : ATTENZIONE TRA ESSI: FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL-DIFEN/TEBU/CONAZOLO (TUTTI 1 trattamento/MASSIMO/ANNO).
mentre: FENBU/PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 TRATTAMENTI/MAX/ANNO). Associare ad essi ZOLFO BAGNABILE (SE NON GIÀ FORM.NE COMBI) OPPURE
CIFLUFENAMID(2 TRATT/MAX) O **SPIROXAMINA** (3 TRATT/MAX) O ***FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI** (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : FLUXAPIROXAD (2MAX); BOSCALID (1 TRATT/MAX MEGLIO DA RISERVARE IN FASE DI PRE.CHIUSURA).

NOTA MOLTO BENE: SI CONSIGLIA **GIÀ' DA ORA** DI

PROGRAMMARE LA DISTRIBUZIONE DI ZOLFO IN POLVERE CON TEMPESTIVITA' A INIZIO ALLEGAGIONE (CONSIDERANDO LA VELOCITA' DI CHIUSURA DELLA FIORITURA) COME INTERVENTO CHIAVE DI RINFORZO ANTIOIDICO

Nelle situazioni meno soggette alternativamente, raccorciando gli interventi (!!!) in modo da tenere coperti i prossimi 10-14 giorni, si potrà proseguire la copertura con prodotti a base di Zolfo Bagnabile complementandoli, se compatibili, con prodotti biostimolanti (cerevisane, laminarina ecc) almeno per 3 volte consecutive, anche in funzione antiperonosporica, scegliendo tra quelli bivalenti oppure le ricorrenze a Cos Oga e/o sostanze attive di biocontrollo

INTERVENIRE ENTRO LUNEDÌ 23 MAGGIO

PERONOSPORA. Plasmopara viticola

Restano condizioni di pressione e pericolosità futura molto bassa del patogeno. In funzione del passaggio temporalesco sopra indicato occorre ora accompagnare gli antioidici di lunga persistenza indicati con prodotti antiperonosporici "equiparabili" pertanto si consiglia L'aggiunta di prodotti di **copertura (METIRAM, DITHIANON, FLUAZINAM) associati a INDUTTORI SISTEMICI** (8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX) PREFERIBILMENTE, FOSFONATO DI DISODIO (6MAX)FOSETYL AL(SENZA LIMITI). OPPURE A **AMETOCTRADINA (QoS)** (3 TRATT/MAX) OPPURE A **FLUOPICOLIDE**(2 TRATT/MAX) OPPURE A

***FAMIGLIA/GRUPPO: Qil**
(3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : AMISULBROM (3MAX), CIAZOFAMIDE+ (3MAX)

POSSIBILE

RICORSO ANCHE ALLE RECENTI MISCELE

OXATHIPIPROLIN (2 TRATT/MAX) + ZOXAAMIDE.

Nei siti meno soggetti, con le specifiche indicate nella sezione Oidio, possibile il ricorso a soli prodotti di copertura rameici con Biostimolanti come da sopraindicato consiglio.

ATTENZIONE!!!! Nelle miscele estemporanee di fungicidi (compreso combi-pack) non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, lo zolfo, i Fosfonati di Potassio, il Fosfonato di disodio, il Fosetil-Al e tutti i prodotti biologici.

CONSULTARE IL PROPRIO TECNICO PER ULTERIORI DELUCIDAZIONI IN MERITO

TUTELA APISTICA ESTREMA ATTENZIONE!

La Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, prevede:

"Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api ... durante la fioritura, ..., altresì vietati tali tratt. se sono presenti secrezioni nettariifere extraforali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia fatto lo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia attesa l'essiccazione totale dei fiori di tali essenze in modo da non attirare più le api". PERTANTO OCCORRE VERIFICARE ATTENTAMENTE EVENTUALI INDICAZIONI DI TOSSICITA' IN MERITO RIPORTATE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.
INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE