

2

2

Comunicato Per La Difesa In Viticoltura Difesa Integrata Volontaria VITE . Norme Tecniche Aca 01

2023 Del 3 MAGGIO ore 14.30 2023

Situazione

L'evento piovoso del 30.4-1.5, prospettato come più significativo nell'interruzione(al Sud) del lunghissimo periodo siccitoso iniziato nell'autunno 2021, ha in realtà portato quantitativi di pioggia caduti molto variabili, generalmente meno consistenti del previsto, e localizzati prevalentemente nelle aree più a sud(e) occidentali della provincia di Cuneo. I quantitativi più consistenti nell'albese e comuni limitrofi sono dell'ordine dei 60 mm.

Peronospora (Plasmopara viticola)

Non è esclusa- da alcuni modelli- la partenza di infezioni primarie del patogeno. Inoltre le previsioni, seppur poco affidabili, di perdurante instabilità temporalesca per tutta la settimana prossima, con temperature in deciso aumento, concorrono a delineare un quadro di rischio infettivo medio-elevato per cui

SI CONSIGLIA DI TRATTARE

ENTRO

SABATO

06/mag

UTILIZZANDO

*FAMIGLIA/GRUPPO: 'COPERTURA RAMEICI' (12 KG RAME METALLO/ANNO MAX. NEL TRIENNIO 2022-2024 CON MAX 5 KG/ANNO) PREFERIBILMENTE TRA QUELLI A MAGGIOR PERSISTENZA (PER. ES SOLFATO TRIBASICO. **OPPURE**

*FAMIGLIA/GRUPPO: altri COPERTURA: (4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): DITHIANON (4 MAX FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM (4 MAX) CON ESCLUSIONE- PREFERIBILE- DI FOLPET (4 MAX). METIRAM(3 MAX)

SE DA SOLO, FINO ALL'ALLEGAGIONE). **IN ASSOCIAZIONE**

*FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI (8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX), FOSFONATO DI DISODIO (6MAX). **O IN ASSOCIAZIONE**

*FAMIGLIA/GRUPPO4: CAA (4 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO. DOPO 3 UTILIZZI -EVENTUALI CONSECUTIVI- OBBLIGO DI ALTERNARE UNA SA DI GRUPPO DIVERSO): DIMETOMORF (4MAX), IPROVALICARB(4MAX), MANDIPROPAMIDE(4MAX), VALIFENALATE(4MAX), BENTHIAVALICARB(2MAX) **OPPURE IN FINE**

COPERTURA+CIMOXANIL(3MAX)

Per le aziende in difesa biologica previa valutazione del dilavamento ed in chiave preventiva è opportuno ripetere il trattamento con le indicazioni presenti nel bollettino 1 bis

Oidio (Uncinula necator)

VISTO L'AVVIO GIA' SEGNALATO DI INFEZIONI 'PRIMARIE' ED IL DECORSO INIZIO PRIMAVERILE CHE PROSEGUE PREDISPONENTE, SI CONSIGLIA IN ABBINAMENTO

L'associazione con prodotti contenenti Zolfo preferibilmente in formulazione oleosa (minor dilavamento)

Nelle situazioni più a rischio (in crescendo di gravità) *SPIROXAMINA (3T/MAX) *MEPTILDINOCAP(2T/MAX)

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE