

10

05/08/2023

Comunicato Per La Difesa In Viticoltura

Difesa Integrata Volontaria VITE . Norme Tecniche Aca 01

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

Situazione

IL PASSAGGIO TEMPORALESCO IN CONCLUSIONE, DOVREBBE APRIRE FINALMENTE L'INGRESSO AD UN PERIODO STABILE SOLEGGIATO SEPPURE FRESCO IN AVVIO (MINIME BEN SOTTO AI 15 DA DOMANI IN RIPRESA A FINE SETTIMANA PROSSIMA). L'INVAIATURA, SUI VITIGNI PIÙ PRECOCI A SEGNARE IL PASSO, SI PRESENTA IN LEGGERO RITARDO RISPETTO ALLA MEDIA SOPRATTUTTO IN PROSPETTIVA DI COMPLETAMENTO ANCHE A CAUSA DEL CARICO PRODUTTIVO SPESSO GENEROSO. SI ATTENDE DI VALUTARNE IL SUO COMPLETAMENTO TRA 2 SETTIMANE.

Peronospora (Plasmopara viticola)

ANCORA ESTREMA ATTENZIONE NEI VIGNETI DI BASSA COLLINA E/O PIÙ VIGOROSI/ SOGGETTI CON PRESENZA (DIFFUSA) DI MACCHIE E/O SPORULAZIONE IN RIVITALIZZAZIONE PROPRIO IN QUESTI GIORNI. COME GIÀ SPESSO INDICATO, SI RI. CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN NUOVO TRATTAMENTO TRASCORSI MASSIMO 10-11 GIORNI DAL PRECEDENTE AL FINE DI PRESERVARE L'EFFICIENZA FOTOSINTETICA DELLA PARETE VEGETATIVA FINO IN PROSSIMITÀ DELLA VENDEMMIA.

TRATTARE

ENTRO

LUNEDI-MARTEDI 7-8 AGOSTO

e ancora, successivamente, trascorsi non più di 11 giorni dal precedente trattamento mantenendo criterio di ANTICIPO su eventuali temporali che dovessero presentarsi dopo ferragosto. soprattutto nei vigneti interessati dalla presenza di macchie fogliari Utilizzare prodotti contenenti esclusivamente,

BIO *FAMIGLIA/GRUPPO: 'COPERTURA RAMEICI' : (12 KG RAME METALLO/ANNO MAX. NEL TRIENNIO 2022-24 CON MAX 5 KG/ANNO) PREFERIBILMENTE TRA QUELLI A MAGGIOR PERSISTENZA (PER. ES SOLFATO TRIBASICO., OSSICLORURI)

Oidio (Uncinula necator)/ BLACK ROT!!!

In ABBINAMENTO ALL'ANTIPERONOSPORICO SI CONSIGLIA

Normalmente solo l'associazione con prodotti contenenti Zolfo oppure o in abbinamento a Bicarbonato di potassio . Utilizzabile in difesa Biologica

ANCORA PER QUESTO TRATTAMENTO E SUCCESSIVO SUI ROSSI TARDIVI (E/O FINO A COMPLETAMENTO DELL'INVAIATURA), COME ULTIMO SUI BIANCHI TARDIVI

EVENTUALE TERZO TRATTAMENTO INSETTICIDA CONTRO VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA

VEDERE APPOSITO BOLLETTINO, CONSULTARE IL PROPRIO TECNICO

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPALI ATTIVI, AVVERSAITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO IL RESPONSABILE ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI TRIPRODOTTO CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSAITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE