

9

17/07/2023

Comunicato Per La Difesa In Viticoltura

9

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

Difesa Integrata Volontaria VITE . Norme Tecniche Aca 01

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

Situazione

Nelle posizioni più asciutte su vitigni spia 'brachetto, dolcetto, pinot nero e, nebbioli a seguire di qualche giorno, ci si avvia verso l'esordio dell'invaiaura. Esso è atteso intorno all'inizio dell'ultima decade di luglio, con qualche giorno di ritardo rispetto alla data media dal 2000. Alla prima vera ondata di calore dell'annata, la settimana scorsa, seguita da una parentesi temporalesca, sembra che si vada ora incontro ad un nuovo importante innalzamento delle temperature in concomitanza con la ripresa dell'alta pressione. ATTENZIONE ALLE SFOGLIATURE (NEBBIOLI IN PARTICOLARE!!!!) LA FASE DI PRE.INVAIATURA CONCOMITANTE A PICCHI REPENTINI DELLE TEMPERATURE/ E/O SBALZI DI IRRAGGIAMENTO POST TEMPORALESCHI (GIORNATE PIÙ LIMPIDE) LO ESPONE A DANNI DA SCOTTATURE INTENSI (GIÀ RILEVATI IN QUESTI GIORNI) ! LIMITARE GLI INTERVENTI SUI LATI NORD E/O EST DEL FILARE!

Peronospora (Plasmopara viticola)

ESTREMA ATTENZIONE NEI VIGNETI DI BASSA COLLINA E/O PIÙ SOGGETTI CON PRESENZA (DIFFUSA) DI MACCHIE E/O SPORULAZIONE NON DEL TUTTO BLOCCATA. COME GIÀ INDICATO, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN NUOVA TRATTAMENTO TRASCORSI MASSIMO 10-11 GIORNI DAL PRECEDENTE ESEGUITO. VISTO IL CARICO PRODUTTIVO GENERALMENTE ELEVATO SARA' FONDAMENTALE MANTENERE LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE NEO.FORMATA.

TRATTARE

ENTRO

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

Trascorsi non più di 10 giorni dal precedente trattamento mantenendo criterio di ANTICIPO su previsioni di temporali, soprattutto nei vigneti interessati dalla presenza di macchie fogliari. Utilizzare prodotti contenenti esclusivamente, o, se diversamente indicato, in alternativa (o), in alternativa o aggiunta (e/o), in associazione (+), ovvero anche in formulati commerciali che le contengono in miscele già formulate (mixgf): **QUESTE ULTIME ESTREMAMENTE CONSIGLIATE IN QUESTO TRATTAMENTO SPECIFICO**

BIO *FAMIGLIA/GRUPPO: 'COPERTURA RAMEICI': (12 KG RAME METALLO/ANNO MAX. NEL TRIENNIO 2022-24 CON MAX 5 KG/ANNO) PREFERIBILMENTE TRA QUELLI A MAGGIOR PERSISTENZA (PER. ES SOLFATO TRIBASICO., OSSICLORURI)

FAMIGLIA/GRUPPO: altri COPERTURA: (5 (innalzato in deroga) TRATT. COMPLESSIVI/MAX/ANNO): TRA FLUAZINAM (4 MAX), FOLPET (5* MAX), DITHIANON (4 MAX), METIRAM(3 MAX) ATTENZIONE ULTIMI DUE NON PIÙ UTILIZZABILI IN QUANTO PREVISTO LIMITE ALL' ALLEGAGIONE

S

+

*FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL

AL(SenzaimiteL); FOSFO.TO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).

CON EVENTUALE AGGIUNTA DI PRODOTTI ENDOTERAPICI PRECEDENTEMENTE INDICATI, NEL RISPETTO DEI VINCOLI MASSIMI, NELLE SITUAZIONI PIÙ SOGGETTE E/O VITIGNI A BACCA NERA/ PIÙ TARDIVI

Oidio (Uncinula necator)/ BLACK ROT!!!

Sintomi non in forte progressione. Con l'invaiaura si avvicina la fase non più sensibile delle bacche al patogeno

In ABBINAMENTO ALL'ANTIPERONOSPORICO SI CONSIGLIA

Normalmente solo l'associazione con prodotti contenenti Zolfo oppure o in abbinamento a Bicarbonato di potassio . Utilizzabile in difesa Biologica

In eventuale aggiunta, (ed in tal caso con minimo dosaggio di zolfo) nelle situazioni più a rischio (p.es.): Vigneti colpiti nella scorsa stagione e/o vitigni sensibili e/o posizioni storicamente soggette e/o scarsa copertura precedente e/o fase fenologica di massima sensibilità (immediato post-allegazione)

Nelle situazione più soggette/tardive possibile ultimo RICORSO Ad uno dei PRODOTTI sotto indicati TRA LORO IN ALTERNATIVA ,

*FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO ANCHE CON ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN) : AZOXY-(2 TRATT.MAX)- TRIFLOXY-PYRACLO-STROBIN (ENTRAMBI 3MAX) *FAMIGLIA/GRUPPO: *CMR" (2 TRATT.

Totali /MAX/ANNO): PROQUINAZID (2 T/MAX), BUPIMIRATE (2 T/MAX), PYRIFENONE***
2T/MAX)

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO IL RISCHIO E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENDESI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI TRAPOLITE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE