

Centro Assistenza
Tecnica Langhe
Roero Dogliani
Monregalese
COMUNICATO

NR

10

17 giu 24



CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
Associazione provinciale di CUNEO



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO

NR

10

17 giu 24

SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE
Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1

SITUAZIONE

Centro Assistenza Tecnica Langhe, Roero, Dogliani Monregalese

SEPPUR CON UN DECORSO MOLTO VARIABILE E DISOMOGENEO VA COMPLETANDOSI OVUNQUE L'ALLEGAGIONE, CON ANCORA SOLO POCHI VITIGNI TARDIVI IN SITI NON PRECOCI IN FASE CONCLUSIVA DI FIORITURA. CONTRARIAMENTE, ALCUNI NEBBIOLI, PINOT NERI, BARBERE E, TRA I BIANCHI, MOSCATI E CHARDONNAY SONO PROSSIMI ALLA FASE DI CHIUSURA GRAPPOLO (BBCH 75-77). E' ATTESO UN PASSAGGIO TEMPORALESCO ISOLATO VENERDI', IN UN CONTESTO PIU' AMPIO DI AUMENTO NETTO DELLE TEMPERATURE E, PAREBBE FINALMENTE, CONSOLIDAMENTO DELL'ALTA PRESSIONE.

PERONOSPORA (Plasmopara viticola)

RISCHIO

IL RISCHIO E' ORA NETTAMENTE DIVERSIFICATO A SECONDA DELLA PRESENZA O MENO DI ATTACCHI FOGLIARI E/O DEL PATOGENO E GRADO DI SPORULAZIONE. ELEVATA LA CASISTICA ANCHE DI VIGNETI ESENTI SE CORRETTAMENTE TRATTATI. ANCHE LA POSIZIONE GIOCHERA' OVVIAMENTE UN RUOLO CHIAVE NELLO SVILUPPO DEL PATOGENO.

SI CONSIGLIA DI RIPRISTINARE IL TRATTAMENTO IN ANTICIPO SUL PASSAGGIO TEMPORALESCO PREVISTO PER VENERDI

ENTRO GIOVEDI 20 GIUGNO

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE IN FORMAZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIA' LE CONTENGONO

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATT./I/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMTE= SL

1***FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM(4), FOLPET(4). CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

****SI RICORDA CHE E' STATA OTTENUTA DEROGA PER AUMENTO A 6 DEL NUMERO MASSIMO DI TRATTAMENTI DI QUESTO GRUPPO.

SI CONSIGLIA DI PRIVILEGIARE il pa FLUAZINAM, DOTATO DI CONTEMPORANEA EFFICACIA ANTIBOTTRICA OVE COMPLETAMENTE RAGGIUNTA L'ALLEGAGIONE

OPPURE

2***FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI' (5 KG RAME METALLO/ANNO MAX. 12 KG/MAX DAL 2022-2024)

IN MISCELA CON

4***FAMIGLIA/GRUPPO: CAA (4 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO. DOPO 3 USI CONSECUTIVI, OBBLIGO ALTERNARE S.A. DI ALTRO GRUPPO): DIMETOMORF(4),

O

5***FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3) : BENALAXYL-M (3),METALAXYL-M (3). METALAXIL REINTRODOTTO (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)

E/O

3***FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).

ALTRE S.A "SINGOLE"

8*** ZOXAMIDE*** (4)

9***AMETOCTRADINA*** (QoS) (3) .

12***FLUOPICOLIDE*** (2) (2MAX CON METALAXIL)

DIFESA BIOLOGICA

NELLA DIFESA BIOLOGICA SI RACCOMANDA LA SCELTA DI FORM.TI RAMEICI OPPORTUNI A MAGGIOR PRONTEZZA O PERSISTENZA A SECONDA DELLA SITUAZIONE UTILIZZANDO IL MINIMO APPORTO DI RAME POSSIBILE SEMPRE IN ANTICIPO SU PIOGGE E CON INTERVALLI CONSEGUENTI AI DILAVAMENTI

2***FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI' (28 KG RAME METALLO in 7 ANNI- con riferimento medio a 4 kg/ettaro/anno.

OIDIO (Uncinula necator)

RISCHIO

LA FASE DELL'IMMEDIATO POST ALLEGAGIONE-INGROSSAMENTO BACCHE RISULTA ESTREMAMENTE SENSIBILE ALLE INFEZIONI DEL PATOGENO. SI SONO RISCONTRATI I PRIMI SINTOMI SU GRAPPOLI

ASSOCIARE ALL'ANTIPERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA

SI RICORDA OTTIMO COMPLETAMENTO DELLA STRATEGIA ANTIOIDICA CON LA DISTRIB.NE DI ZOLFO IN POLVERE (DOSAGGI 25-30 KG/HA)

4***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTER.TIVA)

5***FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO ANCHE ASSIEME A ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN(3) : AZOXY (2)/TRIFLOXY-STROBYN 9***CIFLUFENAMID(2 T/MAX)

NEI VIGNETI PIU' AVANZATI NELL'ALLEGAGIONE POSSIBILE CONSIDERARE INOLTRE:

6***FAMIGLIA/GRUPPO: "CMR" (2 TRATT. TOTALI /MAX/ANNO): PROQUINAZID (2), BUPIMIRATE (2), PYRIOFENONE(%) (2)

7***FAMIGLIA/GRUPPO: ARYL-FENIL-CHETONI (3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : METRAFENONE (3); PYRIOFENONE(%) (2MAX)

O IN FINE

8***FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI(2 TRAT. TOTALI/MAX/ANNO) : FLUXAPYROXAD(2); BOSCALID (1MAX) ESCLUSO EVENTUALE TRATT.TO AL BRUNO V.ESCA NEL FC CON PYRACLOSTROBIN.

DIFESA BIOLOGICA.

ASSOCIARE AI RAMEICI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO BAGNABILE E/O BICARBONATO DI POTASSIO.

EVENTUALMENTE ASSOCIATI A

10***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI :

E/O SPECIFICI PRODOTTI MICROBIOLOGICI

Da usare ANCHE in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai 'tradizionali'. Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/avversità.

PRIMO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER FLAVESCEZZA DORATA (VERSO VETTORE SCAPHOIDEUS TITANUS)

VEDERE LE INDICAZIONI SPECIFICHE RIPORTATE NEL BOLLETTINO 9BIS

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE E' LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. E' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITA' ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).