



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO

CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
Associazione provinciale di CUNEO



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO



COMUNICATO
NR

3

18 apr 24

NR

3

18 apr 24

SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1

SITUAZIONE

DOPO IL DECORSO TERMICO DELL'INVERNO ED INIZIO PRIMAVERA (AD OGGI) PIÙ CALDO DI SEMPRE, SI PROSPETTA UN RITORNO DI FREDDO SEVERO IN PROLUNGAMENTO PER TUTTA LA SETTIMANA PROSSIMA. I VIGNETI SI TROVANO IN UNA FASE VEGETATIVA AVANZATA MAI (O RARISSIMAMENTE) OSSERVATA PRIMA IN QUESTA MOMENTO. SI VA DALLLO SVILUPPO DI 50-60 CM DEI NEBBIOLI PIÙ ESPOSTI (CON INFIORESCENZE SEPARATE A BBCH 55) AI PIÙ TARDIVI INTERNAZIONALI A BACCA NERA E/O ALCUNI BIANCHI NEI FONDOVALLE COMUNQUE RICETTIVI A 2-3 FOGLIE DISTESE PROSSIMI AI 10 CM DI SVILUPPO. PER L'INIZIO DI SETTIMANA PROSSIMA È DATO PER PIÙ SOLIDO (SEPPUR IN FASE PREVISIONALE ANCORA CANGIANTE) UN PASSAGGIO PERTURBATO CHE ORA PARE MEDIO INTENSO (NEI QUANTITATIVI E NELLA PROBABILITÀ DI PIOGGIA)

PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

RISCHIO

SONO AMPIAMENTE VERIFICATE AD OGGI "LA CONDIZIONI DI RICETTIVITÀ AL 95% DELLA VEGETAZIONE E LA MATURITÀ QUANTO MAI PRECOCE DELLE OOSPORE. *NON È ESCLUSO INOLTRE (DA CONSULTAZIONE DEI MODELLI) CHE SI POSSANO ESSERE GIÀ INNESCAE INFEZIONI PRIMARIE (BLANDE) SU PIOGGE RISALENTI ALLA PRIMA DECADE DEL MESE. RESTANO COME FATTORE NON PREDISPOSENTE SOLTANTO LE TEMPERATURE MOLTO BASSE DEI PROSSIMI GIORNI COME PREMESSO. * NON POSSIAMO NON CONSIDERARE, INFINE, NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ANCHE * L'INOCULO MASSICCIO LEGATO ALLA PRESSIONE EPIDEMICA MOLTO FORTE, DIFFUSAMENTE, DELLA SCORSA STAGIONE ED ULTERIORI INCOGNITE

PERTANTO

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PRIMO TRATTAMENTO

ENTRO

DOMENICA 21 APRILE

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

LE SEGUENTI S.A. DI SEGUITO ELENCAE CON LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1***FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINC CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

IN CASO DI RICORSO AL RAME UTILIZZARE FORME CHIMICHE A MINOR PRONTEZZA TRA SOLFATO TRIBASICO E OSSICLORURO, OSSIDULO A DOSAGGI MINIMI. ELEVATO RISCHIO DI FITOTOSSICITÀ!

13***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI : CEREVISANE, LAMINARINA, OLIC

Sono utilizzabili in situazioni di bassa pressione e/o complementariamente, rispettando le indicazioni di etichetta. [Non concorrono] al raggiungimento di limiti numerici e/o massimi per avversità previsti

OIDIO (*Ucinula necator*)

RISCHIO

NELLA GENERALITÀ DEI CASI

SI CONSIGLIA SOLO L'ASSOCIAZIONE DI PRODOTTI A BASE ZOLFO PREFERIB. TE FORMA LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO

MENTRE

NELLE SITUAZIONI PIÙ PROBLEMATICHE, SOPRATTUTTO IN CASO DI VIGNETI COLPITI DURANTE O NEL FINALE DELLA SCORSA STAGIONE (O STORICAMENTE) ASSOCIARE

3***SPIROXAMINA (3T/MAX)

ALTRI CONSIGLI TECNICI

VALUTARE IL RICORSO A FERTILIZZANTI FOGLIARI A BASE DI ALGHE O BIOSTIMOLANTI IN GENERE IN SUPPORTO A SBALZI TERMICI

PER ACCURATE VALUTAZIONI CONTATTARE SEMPRE IL PROPRIO SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESEI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).