



FEDERAZIONE COLTIVATORI  
DIRETTI CUNEO

CONFEDERAZIONE ITALIANA  
AGRICOLTORI  
Associazione provinciale di CUNEO



UNIONE PROVINCIALE  
AGRICOLTORI CUNEO

COMUNICATO  
NR

4

23 apr 24

NR

4

23 apr 24

## SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1

### SITUAZIONE

IL RITORNO DI FREDDO TARDIVO NELLA MATTINA DI VENERDI SCORSO HA CAUSATO DANNI - SU VASTA SCALA - FORTUNATAMENTE RELATIVAMENTE "CONTENUTI". DOPO LE PIOGGE DILAVANTI (20-40 MM) PREVISTE IN CONCLUSIONE NELLA GIORNATA ODIERNA, SI PROFILA -DOPO UNA PARENTESI ASCIUTTA- UNA RIPRESA DELLE PIOGGE IN CRESCENDO D'INTENSITA' E PERDURANTI PER TUTTA LA SETTIMANA PROSSIMA

### PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

RISCHIO

PER LE STESSO CONSIDERAZIONI RIPORTATE NEL PRECEDENTE BOLLETTINO NR 3, AMPLIFICATE DALLE NOTEVOLI PIOGGE 'PREPARATORIE' CADUTE SOPRELENATE,

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL SECONDO TRATTAMENTO ENTRO **VENERDI 26 APRILE**

### SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

LE SEGUENTI S.A. DI SEGUITO ELENCAE CON LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4 FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM(4), FOLPET(4).  
CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

SCEGLIENDO PREFERIBILMENTE, TRA QUESTE, LE S.A. CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO  
E SECONDO LA DISPONIBILITA' DELLE DIVERSE FORMULAZIONI COMMERCIALI CHE LE CONTENGONO

2\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI' (5 KG RAME METALLO/ANNO MAX. 12 KG/MAX DAL 2022-2024)

RICORRERE A FORME CHIMICHE A MAGGIOR PERSISTENZA TRA SOLFATO TRIBASICO E OSSICLORURO, OSSIDULO

RESTA RISCHIO DI FITOTOSSICITA'

### IN MISCELA CON

3\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX)

E/O

10\*\*\*CIMOANIL\*\*\* (3)

13\*\*\*ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI : CEREVISANE, LAMINARINA, (

*Sono utilizzabili in situazioni di bassa pressione e/o complementariamente, rispettando le indicazioni di etichetta.  
Non concorrono al raggiungimento di limiti numerici e/o massimi per avversità previsti*

### OIDIO (*Uncinula necator*)

RISCHIO

LE PIOGGE INTENSE SFAVORISCONO IL PATOGENO

NELLE SITUAZIONI MENO PROBLEMATICHE SI CONSIGLIA L'ASSOCIAZIONE DI SOLI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO (ATTENZIONE IN CASO DI UTILIZZO DI DITHIANON)

MENTRE

NELLE SITUAZIONI PIU' PROBLEMATICHE, SOPRATTUTTO IN CASO DI VIGNETI COLPITI DURANTE LA SCORSA STAGIONE (O STORICAMENTE) ASSOCIARE

3\*\*\*SPIROXAMINA (3T/MAX)

2\*\*\*MEPTILDINOCAP(2MAX)

VALUTANDONE CON IL PROPRIO TECNICO L'OPORTUNITA' DATE LE TEMPERATURE MINIME PREVISTE ANCORA MOLTO BASSE

### ALTRI CONSIGLI TECNICI

VALUTARE IL RICORSO A FERTILIZZANTI FOGLIARI A BASE DI ALGHE/ALTRE FORMULAZIONI IN SUPPORTO DI RIPRESA A SBALZI TERMICI

PER ACCURATE VALUTAZIONI CONTATTARE SEMPRE IL PROPRIO SERVIZIO TECNICO

### BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE E' LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. E' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITA' ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).