

COMUNICATO  
NR**6**

9 mag 24

FEDERAZIONE COLTIVATORI  
DIRETTI CUNEOCONFEDERAZIONE ITALIANA  
AGRICOLTORI  
Associazione provinciale di CUNEOUNIONE PROVINCIALE  
AGRICOLTORI CUNEO

NR

**6**

9 mag 24

**SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE**  
**Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1****SITUAZIONE**

VERSO LA CHIUSURA UNA PRIMA DECADE DI MAGGIO PIUTTOSTO PIOVOSA CON SOMMATORIE DI PRECIPITAZIONI (MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA), DAL 1 DEL MESE, SU VALORI DI 40 mm +/-10. L'attuale parentesi di alta pressione pare non abbia vita lunga, essendo in previsione un ritorno delle piogge da lunedì. Le stesse sono attualmente previste perduranti per tutta la settimana prossima. Nei vigneti di Nebbioli-Moscati et al/siti più precoci, con ancora un discreto anticipo, ci si avvicina alla fioritura (inizio previsto entro 7-10 gg). Discreto riscontro di fenomeni di filatura delle infiorescenze.

**PERONOSPORA (Plasmopara viticola)****RISCHIO**

ATTENZIONE, SI PROSPETTA UNA FASE ESTREMAMENTE CRITICA PER LA DIFESA DA QUESTO PATOGENO. LA MODELLISTICA, COME GIÀ PRECEDENTEMENTE DETTO, SEGNA LA L'AVVIO DI PRIMARIE RIPETUTE IN RELAZIONE AGLI EVENTI PIOVOSI GIÀ DI FINE APRILE. IN QUESTI GIORNI POTREBBE MANIFESTARSI LA FUORIUSCITA DI MACCHIE INERENTI AD ESSI E, SCALARMENTE, DI QUELLI SUCCESSIVI. IN CASO DI CONCOMITANTE SPORULAZIONE DELLE STESSE POTREBBERO PERTANTO PARTIRE ANCHE INFEZIONI SECONDARIE.

SI CONSIGLIA DI TRATTARE ASSOLUTAMENTE

NON PIÙ TARDI DI LUNEDÌ 13 MAGGIO

**NEL CASO DI TRATTAMENTI ESEGUITI NEI PROSSIMI GIORNI/VEGETAZIONE PIÙ SVILUPPATA (SI SEGNA LA DISOMOGENEITÀ NOTEVOLE)**

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

LE SEGUENTI S.A. DI SEGUITO ELENCA TE CON LE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

**NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATT./TI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMITE= SL**

1\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM(4), FOLPET(4).  
CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

IN MISCELA CON

5\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3) : BENALAXYL-M (3), METALAXYL-M (3). METALAXIL REINTRODOTTO (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)

**IN ALTERNATIVA, O SE IL TRATTAMENTO FOSSE ESEGUITO TRA DOMENICA E LUNEDÌ, RICORRERE PREFERIBILMENTE, IN ASSOCIAZIONE CON LE S.A DI COPERTURA 1\*\*\***

A

4\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: CAA (4 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO. DOPO 3 USI CONSECUTIVI, OBBLIGO ALTERNARE S.A. DI ALTRO GRUPPO): DIMETOMORF(4),  
I PROVALICARB(4) MANDIPROPAMIDE(4), VALIFENALATE(4), BENTHIAVALICARB(2 ! ) IMPIEGABILE SOLO ANCORA FINO A FINE 2024

**TUTTI IN EVENTUALE ASSOCIAZIONE (AGGIUNTIVA) CON**

3\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTT. SISTEMICI: (8 TRATT., COMPLESS./MAX/ANNO): FOSFOTO DI POTASSIO(5MAX), FOSFOTO DI DISODIO(6MAX).

**NELLA DIFESA BIOLOGICA SI RACCOMANDA LA SCELTA DI FORM.TI RAMEICI OPPORTUNI A MAGGIOR PRONTEZZA O PERSISTENZA A SECONDA DELLA SITUAZIONE UTILIZZANDO IL MINIMO APPORTO DI RAME POSSIBILE SEMPRE IN ANTICIPO SU PIOGGE E CON INTERVALLI CONSEQUENTI AI DILAVAMENTI**

2\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI' (28 KG RAME METALLO in 7 ANNI- con riferimento medio a 4 kg/ettaro/anno. Limite massimo annuo di 5 kg. )

**OIDIO (Uncinula necator)****RISCHIO**

IL PERIODO DI PIOGGE INTENSE APPENA CHIUSO, SI RITIENE NEL COMPLESSO NON FAVOREVOLE AL PATOGENO. TUTTAVIA I RISCONTI DI SINTOMI FOGLIARI NON SONO INFREQUENTI ED OCCORRE TENERE IN CONSIDERAZIONE PREVENTIVA IL RISCHIO BLACK ROT CON QUESTO AVVIO DI STAGIONE ESTREMAMENTE UMIDO

NELLE SITUAZIONI MENO PROBLEMATICHE SI CONSIGLIA L'ASSOCIAZIONE DI SOLI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO (EVENTUALMENTE IN ASSOCIAZIONE A S.A /AGENTI ATTIVI BIOLOGICI)

**MENTRE**

NELLE SITUAZIONI PIÙ PROBLEMATICHE, SOPRATTUTTO IN CASO DI VIGNETI COLPITI DURANTE LA SCORSA STAGIONE (O STORICAMENTE) ASSOCIARE

5\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI/MAX/ANNO ANCHE ASSIEME A ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN(3) : AZOXY (2)/TRIFLOXY-STROBYN

4\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PENI/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTERNATIVA)  
AGGIUNGERE IN OGNI CASO UN BASSO DOSAGGIO AD ETTARO DI ZOLFO BAGNABILE COME PARTNER DI COPERTURA SE NON GIÀ IN FORMULAZIONE COMBI

**DIFESA BIOLOGICA. ASSOCIARE AI TRATTAMENTI RAMEICI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO BAGNABILE O BICARBONATO DI POTASSIO, ASSIEME A**

10\*\*\*ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI

**ALTRI CONSIGLI TECNICI**

VALUTARE IL PROSEGUIMENTO DI LINEE FERTILIZZANTI FOGLIARI A BASE DI ALGHE/ALTRE FORMULAZIONI (MICROELEMENTI) IN PREPARAZIONE ALLA FIORITURA

**PER ACCURATE VALUTAZIONI CONTATTARE SEMPRE IL PROPRIO SERVIZIO TECNICO****BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE**

**TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).**