

COMUNICATO

NR

7

16 mag 24



CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
Associazione provinciale di CUNEO



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO

NR

7

16 mag 24

SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE
Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1

SITUAZIONE

Le piogge di questi giorni, con nuovi apporti previsti oggi, sono state molto copiose arrivando prossime ai 50 mm. Dopo una breve pausa tendenzialmente più asciutta fino a domenica, attualmente è prevista una nuova elevata instabilità per tutta la prima parte della settimana prossima. I Nebbioli-Moscato ed altri vitigni /siti più precoci, sono in pre.fioritura, fase fenologica estremamente delicata.

PERONOSPORA (Plasmopara viticola)**RISCHIO**

A INIZIO SETTIMANA SONO STATE RISCOINTRARE LE PRIME MACCHIE D'OLIO IN DIVERSE SITUAZIONI, SEPPUR, PER ORA, NON IN NUMERO ELEVATO. LA FASE IN RELAZIONE ALL'AVVICINARSI DELLA FIORITURA, RESTA ESTREMANENTE CRITICA PER LA DIFESA DA QUESTO PATOGENO. NON SI ESCLUDE CHE RESTI ANCORA DA MOSTRARSÌ L'ESITO DI PARECCHIE INFEZIONI PRIMARIE MODELLIZZATE DAI DSS PROBABILMENTE CON TROPPO ANTICIPO...

SI CONSIGLIA DI RITRATTARE A NON PIÙ DI**10/ 11 GIORNI**

DAL PRECEDENTE TRATTAMENTO ORIENTATIVAMENTE	TRA	MARTEDI	2	1	MAGGIO
A SECONDA DELLA LINEAA TECNICA SEGUITA	E	MERCOLEDI	2	2	MAGGIO

SALVO IL CASO DI PIOGGE CHE IMPEDISCANO DI STARE ENTRO TALI TEMPI, RENDENDO PERICOLOSO IL POSTICIPO. IN TAL CASO TRATTARE ANCHE DOMENICA

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE NEL RISPETTO DEGLI INTERVALLI MINIMI INDICATI IN ETICHETTA!

LE S.A. DI SEGUITO ELENCA TE IN FORM.ZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIÀ LE CONTENGONO

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATT.TI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMTE= SL

1***FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM(4), FOLPET(4). CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

NEL CASO DEL RAME UTILIZZARE FORME CHIMICHE A MINOR PRONTEZZA TRA SOLFATO TRIBASICO E OSSICLORURO, OSSIDULO A DOSI MINIME ELEVATO RISCHIO DI FITOSSICITA'

3***FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).

4***FAMIGLIA/GRUPPO: CAA (4 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO. DOPO 3 USI CONSECUTIVI, OBBLIGO ALTERNARE S.A. DI ALTRO GRUPPO): DIMETOMORF(4),

5***FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3) : BENALAXYL-M (3),METALAXYL-M (3). METALAXIL REINTRODOTTO (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)

6***FAMIGLIA/GRUPPO: Qil (3): CIAZOFAMIDE (3), AMISULBROM (3, MA NON PIÙ DI 2 CONSECUTIVI SE USATO DA SOLO)

ALTRE S.A "SINGOLE"	8*** ZOXAMIDE*** (4)	9***AMETOCTRADINA*** (QoS)	12***FLUOPICOLIDE*** (2) (2MAX CON METALAXIL)
	11***OXATHIPIPROLIN*** (2MAX SEMPRE IN MISCELA)		

DIFESA BIOLOGICA

NELLA DIFESA BIOLOGICA SI RACCOMANDA LA SCELTA DI FORM.TI RAMEICI OPPORTUNI A MAGGIOR PRONTEZZA O PERSISTENZA A SECONDA DELLA SITUAZIONE UTILIZZANDO IL MINIMO APPORTO DI RAME POSSIBILE SEMPRE IN ANTICIPO SU PIOGGE E CON INTERVALLI CONSEQUENTI AI DILAVAMENTI

2***FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI' (28 KG RAME METALLO in 7 ANNI- con riferimento medio a 4 kg/ettaro/anno. Limite massimo annuo di 5 kg.

OIDIO (Uncinula necator)**RISCHIO**

SI CONFERMA CHE IL PERDURARE DI PIOGGE INTENSE NEL COMPLESSO NON FAVOREVOLE AL PATOGENO. TUTTAVIA I RICONTRI DI SINTOMI FOGLIARI NON SONO INFREQUENTI ED OCCORRE TENERE IN CONSIDERAZIONE PREVENTIVA IL RISCHIO BLACK ROT CON QUESTO AVVIO DI STAGIONE ESTREMANENTE UMIDO. EVENTUALI INFEZIONI DI QUESTO PATOGENO HANNO TEMPI DI INCUBAZIONE MOLTO LUNGHI

ASSOCIARE ALL'ANTIPERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA

0

4***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTER.TIVA)

5***FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO ANCHE ASSIEME A ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN(3) : AZOXY (2)/TRIFLOXY-STROBYN

9***CIFLUFENAMID(2 T/MAX)

DIFESA BIOLOGICA. ASSOCIARE AI RAMEICI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO BAGNABILE E/O BICARBONATO DI POTASSIO.

EVENTUALMENTE ASSOCIATI A

10***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI :

E/O SPECIFICI PRODOTTI MICROBIOLOGICI

Da usare ANCHE in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai 'tradizionali'. Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/avversità.

ALTRI CONSIGLI TECNICI

VALUTARE IL PROSEGUIMENTO DI LINEE FERTILIZZANTI FOGLIARI A BASE DI ALGHE/ALTRE FORMULAZIONI (MICROELEMENTI) IN PREPARAZIONE ALLA FIORITURA

PER ACCURATE VALUTAZIONI CONTATTARE SEMPRE IL PROPRIO SERVIZIO TECNICO

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).