

COMUNICATO
NR

9

6 giu 24



CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
Associazione provinciale di CUNEO



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO

NR

9

6 giu 24

SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE
Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1

SITUAZIONE

PREVALENZA DI FASE FENOLOGICA TRA PIENA E FINE FIORITURA CON SOLO I NEBBIOLI DI VIGNETI PIÙ AVANZATI A GRANO PEPE. SI TRATTA DI UNA FASE ANCORA ESTREMAMENTE SENSIBILE AD ATTACCHI DI PATOGENI FUNGINI IN GENERALE. PER QUANTO RIGUARDA PERONOSPORA E' PROPRIO ORA CHE SI POSSONO INNESSARE PERICOLOSE INFEZIONI VISIBILI NELLA SECONDA METÀ DEL MESE NELLA FORMA 'LARVATA'. L'INSTABILITÀ TEMPORALESCA NUOVAMENTE ALL'ORIZZONTE ALL'INIZIO DELLA SETTIMANA PROSSIMA, DIFFICILMENTE QUANTIFICABILE ED IMPREVEDIBILE NELLA LOCALIZZAZIONE, ASSIEME A BAGNATURE FOGLIARI PRESSOCHÉ GIORNALIERE, RAPPRESENTANO ELEMENTI DI RISCHIO CHE, IN QUESTA FASE, IMPONGONO L'ADOZIONE DI UNA LINEA DI DIFESA ANCORA STRAORDINARIAMENTE ACCORTA, SOPRATTUTTO IN VIGNETI CHE PRESENTINO MACCHIE FOGLIARI DEL PATOGENO.

PERONOSPORA (Plasmopara viticola)

RISCHIO

PER QUANTO PREMESSO NELLA SITUAZIONE PERMANE UN RISCHIO MOLTO ELEVATO, PERTANTO

SI CONSIGLIA DI RITRATTARE AL TERMINE DEL PERIODO DI PERSISTENZA MINIMO DEL PRECEDENTE TRATTAMENTO

ORIENTATIVAMENTE, ENTRO

MARTEDÌ 11 GIUGNO

CON ATTENTA VALUTAZIONE DELL'EVOLUZIONE TEMPORALESCA, ONDE EVITARE CHE SI CREINO ALLUNGAMENTI OLTRE I 10-12 GIORNI MAX A SECONDO DEL FC UTILIZZATO PRIMA

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE IN FORMAZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIÀ LE CONTENGONO

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATT./I/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMITE= SL

1***FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM(4), FOLPET(4).
CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

******SI RICORDA CHE E' STATO OTTENUTA DEROGA PER AUMENTO A 6 DEL NUMERO MASSIMO DI TRATTAMENTI DI QUESTO GRUPPO.**
SI CONSIGLIA DI PRIVILEGIARE il pa FLUAZINAM, DOTATO DI CONTEMPORANEA EFFICACIA ANTIBOTRITICA

3***FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFOTO DI DISODIO(6MAX).

5***FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3) : BENALAXYL-M (3), METALAXYL-M (3). METALAXIL REINTRODOTTO (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)

6***FAMIGLIA/GRUPPO: QIL (3): CIAZOFAMIDE (3), AMISULBROM (3, MA NON PIÙ DI 2 CONSECUTIVI SE USATO DA SOLO)

ALTRE S.A "SINGOLE" 8*** ZOXAMIDE*** (4) 9***AMETOCTRADINA*** (QoS) (3) .
11***OXATHIAPROLIN*** (2MAX SEMPRE IN MISCELA) 12***FLUOPICOLIDE*** (2) (2MAX CON METALAXIL)

DIFESA BIOLOGICA

NELLA DIFESA BIOLOGICA SI RACCOMANDA LA SCELTA DI FORME RAMEICI OPPORTUNI A MAGGIOR PRONTEZZA O PERSISTENZA A SECONDA DELLA SITUAZIONE UTILIZZANDO IL MINIMO APPORTO DI RAME POSSIBILE SEMPRE IN ANTICIPO SU PIOGGE E CON INTERVALLI CONSEQUENTI AI DILAVAMENTI

2***FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI' (28 KG RAME METALLO in 7 ANNI- con riferimento medio a 4 kg/ettaro/anno. Limite massimo annuo di 5 kg.

OIDIO (Uncinula necator)

RISCHIO

PROSEGUE CONTENUTO IL RISCONTRO DI SINTOMI FOGLIARI DEL PATOGENO. IN RELATIVO AUMENTO QUELLI DI **BLACK ROT**. ATTENZIONE AI CICLI INFETTIVI DI QUESTO PATOGENO CHE HANNO TEMPI DI INCUBAZIONE MOLTO LUNGI. DISCRETI RISCONTRI SU BARBERA IN PARTICOLARE ED ALTRI VIT. INTERNAZIONALI DI SINTOMI DI MUFFA GRIGIA

ASSOCIARE ALL'ANTI-PERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA

0

4***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTERATIVA)

5***FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO ANCHE ASSIEME A ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN(3) : AZOXY (2)/TRIFLOXY-STROBYN
9***CIFLUFENAMID(2 T/MAX)

NEI VIGNETI PIÙ AVANZATI NELL'ALLEGAGIONE POSSIBILE CONSIDERARE INOLTRE:

6***FAMIGLIA/GRUPPO: "CMR" (2 TRATT. TOTALI /MAX/ANNO): PROQUINAZID (2), BUPIMIRATE (2), PYRIOFENONE(%) (2)

7***FAMIGLIA/GRUPPO: ARYL-FENIL-CHETONI (3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : METRAFENONE (3); PYRIOFENONE(%) (2MAX)

DIFESA BIOLOGICA. ASSOCIARE AI RAMEICI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO BAGNABILE E/O BICARBONATO DI POTASSIO.

EVENTUALMENTE ASSOCIATI A

10***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI :

E/O SPECIFICI PRODOTTI MICROBIOLOGICI

Da usare ANCHE in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai 'tradizionali'. Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/avversità.

PRIMO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER FLAVESCENTZA DORATA (VERSO VETTORE SCAPHOIDEUS TITANUS)

ATTENDERE! NON È ANCORA IL MOMENTO! LE INFORMAZIONI/DATE SPECIFICHE SARANNO DIVULGATE NEI PROSSIMI BOLLETTINI

ESCLUSIVAMENTE PER LE AZIENDE BIOLOGICHE. SI VEDANO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE. INDICAZIONI SPECIFICHE SONO DIRAMATE DAL SETTORE FITOSANITARIO.

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).

FLAVESCENTZA DORATA DELLA VITE

(Ordinanza n. 4 del 22 giugno 2023 "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* atte ad impedire la diffusione nel territorio della Repubblica italiana")

NON TRATTARE **DURANTE LA FIORITURA DELLA VITE**

Occorre attendere la fine del periodo di fioritura della vite e l'avvenuta allegagione

Salvaguardia degli insetti pronubi

(Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9)

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura.
- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

La violazione delle norme e degli obblighi di legge comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00.

ESCLUSIVAMENTE PER LE AZIENDE BIOLOGICHE:

Sono previsti 2 trattamenti insetticidi obbligatori con piretro: il primo dovrà essere effettuato sui giovani subito **dopo la fine della fioritura** e il secondo ripetuto dopo 7-10 giorni. Non essendo la fioritura ancora conclusa nella stragrande maggioranza dei casi e rilevata la presenza della seconda età del vettore soltanto agli inizi, si consiglia di iniziare al più presto le seguenti attività:

cimare e sfoltire la vegetazione;
vegetazione tra i filari nel caso di presenza di fioriture spontanee, al fine di preservare le api e gli insetti pronubi; in modo da preparare i vigneti per il primo trattamento che indicativamente potrà essere eseguito a partire dal 13-14 giugno, in relazione alle diverse zone e alle fioriture, e anche in considerazione delle piogge previste a inizio della settimana prossima.

- spollonare,
- sfalciare la

IN OGNI CASO SEGUIRE LE INDICAZIONI SPECIFICHE DIRAMATE DAL SETTORE FITOSANITARIO E CONSULTARE IN MERITO I PROPRI TECNICI

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUL PRINCIPAL ATTIVO, AVVERSA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE E' LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. E' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITA' ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).