

Centro Assistenza
Tecnica Langhe
Roero Dogliani
Monregalese
COMUNICATO
NR



27 giu 24



27 giu 24

SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE
Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1

SITUAZIONE

Centro Assistenza Tecnica Langhe, Roero, Dogliani Monregalese

L'ALTA PRESSIONE PROSPETTATA PER L'ULTIMA DECADE DI QUESTO GIUGNO A DIR POCO BIZZARO HA IN REALTA' LASCIATO AMPI SPAZI AD EVENTI TEMPORALESCHI, NUOVAMENTE ALL'ORIZZONTE NEI PROSSIMI GIORNI DI CHIUSURA DEL MESE-INIZIO SUCCESSIVO. ORA PREVALE LA FASE DI PRE-CHIUSURA GRAPPOLO CON MAGGIORE AVANZAMENTO DEL NEBBIOLO/MOSCATO IN TRAGUARDO DI CHIUSURA(BBCH77). SU QUESTO VITIGNO IN PARTICOLARE, PER LA SUA NOTA SENSIBILITA', PRIMI RISCONTI DI USTIONI. ATTENZIONE AL MOMENTO ESTREMAMENTE DELICATO PER QUESTA PROBLEMATICHE, SOPRATTUTTO PERCHE' L'ANNATA, CARATTERIZZATA DA ELEVATA DISPONIBILITA' IDRICA ED ALTERNANZA REPENTINA DI GIORNATE/MOMENTI NUVOLOSE/ CON ALTRE/ CON PICCHI DI IRRAGGIAMENTO, E' ASSOLUTAMENTE PREDISPOSENTE .

PERONOSPORA (Plasmopara viticola)

RISCHIO

L'INSTABILITA' TEMPORALESCA NUOVAMENTE ALL'ORIZZONTE, CON BAGNATURE FOGLIARI INTENSE GIORNALIERE, DETERMINANO PRESENZA COSTANTE DEL PATOGENO SOPRATTUTTO NEI VIGNETI PEGGIO ESPOSTI. PER ESSI, IN PARTICOLARE NON RESTA CHE RACCOMANDARE L'ADOZIONE DI UNA LINEA DI DIFESA MOLTO SERRATA, PER EVITARE SVILUPPI INCONTROLLATI DELLE INFEZIONI FOGLIARI SULLE FEMMINELLE, A BREVE INDISPENSABILI PER IL PROCESSO DI MATURAZIONE.

SI CONSIGLIA DI RITRATTARE AL TERMINE DEL PERIODO DI PERSISTENZA MINIMO DEL PRECEDENTE TRATTAMENTO

ORIENTATIVAMENTE, ENTRO

DOMENICA 30 GIUGNO

ESTREMA ATTENZIONE E LINEA PREVENTIVA IN PARTICOLARE NEI VIGNETI VIGOROSI ED IN PRESENZA DI MACCHIE

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE IN FORM.ZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIA' LE CONTENGONO

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATT.TI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMITE= SL

2***FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI' (5 KG RAME METALLO/ANNO MAX. 12 KG/MAX DAL 2022-2024)

E/O
IN ASSOCIAZIONE

8*** ZOAXAMIDE*** (4)

3***FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).

OPPURE

4***FAMIGLIA/GRUPPO: CAA (4 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO. DOPO 3 USI CONSECUTIVI, OBBLIGO ALTERNARE S.A. DI ALTRO GRUPPO): DIMETOMORF(4),

O IN ALTERNATIVA

5***FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3) : BENALAXYL-M (3), METALAXYL-M (3). METALAXIL REINTRODOTTO (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)

DIFESA BIOLOGICA

NELLA DIFESA BIOLOGICA SI RACCOMANDA LA SCELTA DI FORM.TI RAMEICI OPPORTUNI A MAGGIOR PRONTEZZA O PERSISTENZA A SECONDA DELLA SITUAZIONE UTILIZZANDO IL MINIMO APPORTO DI RAME POSSIBILE SEMPRE IN ANTICIPO SU PIOGGE E CON INTERVALLI CONSEGUENTI AI DILAVAMENTI

2***FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI' (28 KG RAME METALLO in 7 ANNI- con riferimento medio a 4 kg/ettaro/anno. Limite massimo annuo di 5 kg.

OIDIO (Uncinula necator)

RISCHIO

IN PROGRESSIONE IL RISCONTRO DI SINTOMI SU BACCHE/RACIMOLI DEL PATOGENO. DISCRETI RISCONTI DI MUFFA GRIGIA SU BARBERA IN PARTICOLARE ED ALTRI VIT. INTERNAZIONALI

ASSOCIARE ALL'ANTI-PERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA

4***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTER.TIVA)

5***FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO ANCHE ASSIEME A ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN(3) : AZOXY (2)/TRIFLOXY-STROBYN
9***CIFLUFENAMID(2 T/MAX)

6***FAMIGLIA/GRUPPO: "CMR" (2 TRATT. TOTALI /MAX/ANNO): PROQUINAZID (2), BUPIMIRATE (2), PYRIOFENONE(%%) (2)

7***FAMIGLIA/GRUPPO: ARYL-FENIL-CHETONI (3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : METRAFENONE (3); PYRIOFENONE(%%) (2MAX)

O IN FINE

8***FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : FLUXAPYROXAD(2); BOSCALID (1MAX) NON CONTANDO EVENTUALE TRATT.TO AL BRUNO CONTRO ESCA NEL FC IN FORMLZ CON PYRACLOSTROBIN).
TRA QUESTI BOSCALID DOTATO DI ATTIVITA' COLLATERALE ANTIBOTRITICA(NELLA LIMITAZIONE DI GRUPPO 2 MAX/ANNO RIENTRA ANCHE LO SPECIFICO ANTIBOTRITICO ISOFETAMID

FACENDO ESTREMA ATTENZIONE AI LIMITI MASSIMI ED ALL'ALTERNANZA!

DIFESA BIOLOGICA.

ASSOCIARE AI RAMEICI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO BAGNABILE E/O BICARBONATO DI POTASSIO.

EVENTUALMENTE ASSOCIATI A

10***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/ BIOLOGICI :

E/O SPECIFICI PRODOTTI MICROBIOLOGICI

Da usare ANCHE in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai "tradizionali". Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/avversità.

DIFESA DA TIGNOLETTA, TIGNOLA, EULIA

IN ALCUNE ZONE E' INIZIATO IL SECONDO VOLO. VERIFICARE LE CATTURE CON LE APPOSITE TRAPPOLE A FERMOMONI E/O CONSULTAZIONE DI MODELLI. RAGGIUNTA LA SOGLIA, PER LA CORRETTA SCELTA DELL'EVENTUALE S.A. INSETTICIDA, CONSULTARE IL PROPRIO TECNICO. SI RICORDA CHE GLI INSETTICIDI AUTORIZZATI SONO SPECIFICI PER DETERMINATE FASI DEL CICLO DI QUESTI LEPIDOTTERI. INOLTRE SPESSO ESSI HANNO REGISTRAZIONE SPECIE- SPECIFICA (P.ES METOSSIFENOZIDE unicamente contro tignoletta (Lobesia botrana).

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE E' LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. E' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITA' ESCLUSIVA , ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).