

Info n. 4

Del 21/02/2024

NOCCIOLO



AGGIORNAMENTO TECNICO

ANDAMENTO CLIMATICO

SITUAZIONE FENOLOGICA

MONITORAGGIO ERIOFIDE

MONITORAGGIO COCCINIGLIA

POTATURA

ANDAMENTO CLIMATICO


Una fascia di alta pressione interessa le regioni alpine, senza effetti rilevanti al sud delle Alpi a parte rinforzi di venti di foehn su interno valli alpine. Il campo anticiclonico verrà sostituito da un flusso depressionario atlantico, associato al passaggio di una perturbazione tra giovedì e venerdì attiva perlopiù sul settore alpino e nord Piemonte che porterà precipitazioni di lieve intensità.

La fine di febbraio sarà caratterizzata da tempo più variabile associato a un flusso depressionario atlantico. Non sono attesi eventi con precipitazioni estese e durature ma in un contesto in parte soleggiato e variamente nuvoloso vi saranno addensamenti associati a locali piogge o rovesci, tra il 26 e il 27 febbraio.

Temperature in calo con massime tra 8 e 11 gradi, anche inferiori nei giorni più nuvolosi; intorno a 0-2°C a 1500 metri con gelo notturno nei fondovalle.

Nella sottostante figura viene riportata la situazione metereologica registrata presso la Stazione di Cravanzana (CN). Le temperature minime giornaliere comprese tra i -1,5 e i 2,1°C, massime tra i 15,7 e i 21,6°C e le temperature medie comprese tra i 6,8 e i 10,4°C. Precipitazioni totali raggiunte da inizio gennaio 62,8 mm.

Temp Aria (min, med, max), Temp Suolo, Pioggia, Umid



SITUAZIONE FENOLOGICA

I rilievi di campo in questo periodo evidenziano la fase fenologica di piena-fine fioritura maschile e di piena fioritura femminile.

Su tutto il territorio la presenza degli amenti maschili e dei fiori femminili risulta inferiore rispetto alle annate pregresse, dovuto principalmente ai tagli di potatura per eliminazione seccumi e branche colpite da cytospora ed agrilo.



MONITORAGGIO ERIOFIDE

Le forme mobili dell'acaro risultano ancora all'interno delle gemme, **si consiglia di effettuare il monitoraggio visivo in attesa della migrazione.**

In questa fase le **pseudo galle sono ancora chiuse** e si **sconsiglia qualsiasi intervento** con prodotti per contenere l'avversità.



Gemme ipertrofiche



Sezione trasversale di gemma colpita da eriofidi

MONITORAGGIO COCCINIGLIA



Si consiglia di effettuare monitoraggi laddove è stata riscontrata la presenza del fitofago, concentrandosi sulle porzioni apicali dei nuovi rametti e nelle zone in prossimità delle gemme.

POTATURA: RIMOZIONE DEI RESIDUI COLPITI DA *Cytospora* e *Agrilo*

Per prevenire e contenere la diffusione di alcune avversità, *Cytospora* in primis (data la forte presenza riscontrata in campo nella pregressa stagione), non appena verranno concluse le operazioni di potatura **si consiglia di provvedere alla rimozione dei residui.**

Si ricorda che è opportuno proteggere con mastici o paste cicatrizzanti addizionati con prodotti a base di rame i tagli di potatura effettuati sulle pertiche superiori ai 5 cm diametro.

Abbruciamento residui: si rammenta che **dal 15 settembre 2023 e fino al 15 aprile 2024, sull'intero territorio della Regione Piemonte vige il divieto di abbruciamento di materiale vegetale** come previsto dalle disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria del D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021.