

Info n. 22

Del 22/10/2025



AGGIORNAMENTO TECNICO

ANDAMENTO CLIMATICO

SITUAZIONE FENOLOGICA

AGGIORNAMENTO CIMICI

SEGNALAZIONI DI Gleosporiosi e *Anthostoma decipiens*


SEGNALATA PRESENZA DI OIDIO (*Phyllactinia corylicola*) e OIDIO TURCO (*Erysiphe corylacearum*)

FAUNA SELVATICA

ANDAMENTO CLIMATICO

In figura la situazione meteo registrata presso la Stazione di Cravanzana (CN) delle ultime settimane. Temperature massime giornaliere comprese tra i 11,8°C e i 22,3 °C, minime comprese tra i 4,9 °C e i 7,8 °C e medie comprese tra i 10,3 °C e 13,2°C.

Precipitazioni totali nell'ultima settimana: 0.9 mm mentre dall'inizio dell'anno 643,7 mm.



SITUAZIONE FENOLOGICA e RACCOLTA

Ci troviamo nella fase BBCH 93 in quasi tutte le località.

ANTHOSTOMA DECIPIENS

Programmarne il controllo e gestione in post raccolta mediante adeguate potature ed eliminazione del legno infetto/colpito.

Individuare la presenza di rami che presentano i cirri di propagazione del fungo (gocce gommose rosse) e quelli che sono dissecati al fine di procedere alla loro asportazione durante la potatura. E' opportuno proteggere con mastici o paste cicatrizzanti addizionati con prodotti a base di rame i tagli o le ferite più ampie e profonde (superiore ai 5 cm).

BATTERIOSI

Segnalata presenza diffusa.

Programmare gli interventi con prodotti rameici.

Indicazioni sul ciclo di interventi consigliati:

- in autunno a partire dall'inizio della caduta foglie e in caso di attacco grave effettuare 2 trattamenti (inizio e fine caduta foglie);
- in caso di attacco lieve, intervenire con 1 trattamento a metà caduta foglie;



GLEOSPORIOSI

Segnalata elevata presenza sul territorio, maggiormente nei fondo valle. Si riscontrano i primi danni anche su amenti con segnalazioni di cascola di quest'ultimi.

Si ricorda che per il disciplinare di produzione integrata è possibile utilizzare il *Trichoderma asperellum* e *Trichoderma gamsii*.



SEGNALATA PRESENZA DI OIDIO (*P. corylicola*) e OIDIO TURCO (*E. corylacearum*)

Continuano le segnalazioni sia di oidio che del nuovo oidio (*E. corylacearum*) in diversi areali piemontesi. Dato l'aumento di presenza negli ultimi anni, si invitano le aziende che riscontrassero tale problematica nei propri appezzamenti a segnalarlo al proprio tecnico di riferimento al fine di programmare un intervento di difesa volto a ridurre l'inoculo nella fase di post raccolta.

Tipologia di intervento:

- ➔ PRODUZIONE INTEGRATA: zolfo
- ➔ BIOLOGICO: zolfo

FAUNA SELVATICA

Segnalata la presenza di TASSI, GHIRI, CAPRIOLI e soprattutto CINGHIALI in tutti gli areali corilicoli piemontesi.

