



	 FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI CUNEO	 AGRICOLTORI ITALIANI CUNEO CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Associazione provinciale di CUNEO	 UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI CUNEO	
	 VIGNAIOLI PIEMONTESE			
Comunicato N. 6	SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE			Del
	Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 – ACA01			26/05/2026

Fase Fenologica prevalente:

da a

<p>BBCH 62 - 63 Fioritura - 20-30% dei fiori aperti. o</p> 	<p>BBCH 71 - Allegagione - Gli ovari iniziano ad ingrossarsi e fecondazione. Gli stami appassiscono ma restano spesso attaccati al punto d'attacco.</p> 
--	---

Situazione:

In questi giorni si sono susseguite giornate estive con temperature in crescendo a partire dai 30°C del 22.5. Non è escluso che se ne abbiano di tropicali (con T notturne sopra ai 20°C) tra mercoledì e giovedì. Anche l'umidità relativa dell'aria è stata su valori (medi) piuttosto contenuti, dell'ordine del 60%. Confermata netta accelerazione della fase fenologica della fioritura su tutti i vitigni con Nebbiolo anche in allegagione avanzata nei siti più precoci:

PERONOSPORA (*Plasmopara Viticola*) - OIDIO (*Erysiphe Necator*)

Si conferma una situazione di rischio complessivamente molto basso, seppur l'Oidio meriti attenzione preventiva su vitigni e/o areali particolarmente predisposti data la concomitante fase fenologica a cavallo della fioritura già menzionata di estrema sensibilità. Per cui si consiglia:

Di garantire una copertura antiodica con intervalli non maggiori di 12-14 giorni, soprattutto nei vigneti/vitigni in fase di completamento della fioritura a tale scadenza: la distribuzione di zolfo in polvere (ramato) a dosaggi contenuti in relazione alle temperature > 30°C previste nei prossimi giorni è la soluzione tecnica più rispondente e rapida. In caso di impossibilità di trattamenti polverulenti per rispettare tale intervallo massimo valutare ricorso a formulati commerciali contenenti Zolfo in formulazione bagnabile o bicarbonato di potassio (p.a. quest'ultimo che può esplicare, nelle condizioni che si prospettano, un'attività preventiva generale antifungina. Anche selettivamente a livello aziendale, nei vigneti/zone più soggette e/o quelli in presenza di maggiori bagnature fogliari notturne (e soprattutto se presenti macchie fogliari di Peronospora) valutare l'aggiunta di una copertura antiperonosporica con prodotti rameici nelle forme a minor prontezza a dosaggi minimi di etichetta. Solo in casi estremi valutare il ricorso di altri prodotti di copertura quali:

-Dithianon (Max 4 tratt/anno) o Fluazinam (Max 3 tratt/anno) o Folpet (limite di 8 interventi anno con le tre sostanze attive)

-Zooxamide (Max 4 tratt/anno)

-Famiglia/gruppo: Qil (Max 3 tratt/anno totali) - Ciazofamide (Max 3), Amisulbron (Max 3 ma non più di 2 consecutivi se utilizzato da solo)

-Ametoctradina (Max 3 tratt/anno)

Con previsioni metereologiche aggiornate si rivaluteranno indicazioni per eventuale rinnovo trattamento prima di eventuale instabilità temporalesca, che, attualmente è stata fortemente ridimensionata e posticipata per le nostre zone.

Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente o tramite Whatsapp Antonio o Luca

Tutte le indicazioni sui principi attivi, avversità verso le quali sono registrati, limitazioni e dosaggi sono sempre da verificare sulle etichette dei prodotti commerciali e bisogna attenersi scrupolosamente a quanto riportato.