

	 FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI CUNEO	 UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI CUNEO	
	 AGRICOLTORI ITALIANI CUNEO CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Associazione provinciale di CUNEO  VIGNAIOLI PIEMONTESE		
Comunicato N. 5	SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 – ACA01		Del 11/05/2026

Fase Fenologica prevalente:

da _____ a _____

BBCH 55 Infiorescenze distese, fiori chiusi e raggruppati ctra loro	BBCH 61-62 Inizio Fioritura
---	-----------------------------

Situazione:

Gli ulteriori apporti temporaleschi di ieri portano il bilancio cumulativo delle piogge da inizio mese generalmente sui 30 mm con rare situazioni prossime ai 40. La fioritura del Nebbiolo dei siti più precoci è progredita lentamente. Attualmente, dopo il nuovo breve impulso temporalesco previsto per le giornate di giovedì-venerdì, si profilano nel complesso condizioni di minor instabilità meteorologica:

PERONOSPORA (*Plasmopara Viticola*)

I primi riscontri di macchie da infezioni primarie di peronospora segnalati non hanno avuto seguito significativo nel complesso. Restano da considerare potenzialmente pericolosi, in caso di assenza di copertura, gli eventi temporaleschi attualmente visibili nella seconda parte della settimana, dato che la vite si troverà in fase di massima sensibilità (da pre fioritura a fioritura).

Si consiglia di intervenire entro Mercoledì, con una tra le Sostanze Attive di seguito elencate:

-Dithianon (max 4 tratt/anno) o Fluazinam (max 3 tratt/anno) o Folpet (limite di 8 interventi anno con le tre sostanze attive)

-Famiglia/gruppo: Qil (Max 3 tratt/anno totali) - Ciazofamide (Max 3), Amisilbrun (Max 3 ma non più di 2 consecutivi se utilizzato da solo)

-Famiglia/gruppo: CAA (Max tratt/anno totali) – Iprovalicarb, Mandipropamide, Valifenalate

-Famiglia/gruppo: Fenilammidi (Max 3 tratt/anno totali) – Benalaxyl-M, Metalaxyl-M, Metalaxyl (limite di 2 trattamenti in alternanza con Fluopicolide)

-Ametoctradina (Max 3 tratt/anno)

-Fluopicolide (limite di 2 trattamenti in alternanza con Metalaxyl)

Vista la rapidità di crescita è utile proseguire con l'eventuale associazione di:

-Famiglia/gruppo: induttori sistemici – Fosetyl-AL, Fosfito di Potassio, Fosfonato di Sodio

OIDIO (*Erysiphe Necator*)

Tutte le indicazioni sui principi attivi, avversità verso le quali sono registrati, limitazioni e dosaggi sono sempre da verificare sulle etichette dei prodotti commerciali e bisogna attenersi scrupolosamente a quanto riportato.

E'proseguito il riscontro di sintomi fogliari del fungo. La fase temporalesca potrebbe contrastarne lo sviluppo, ma, al tempo stesso si entra in una fase fenologica ad elevata sensibilità di attacchi anche alle infiorescenza.

Si consiglia di abbinare al prodotto antiperonosporico uno dei seguenti principi attivi:

- Meptildinocap (max 2 tratt/anno, prodotto non più in commercio ma utilizzabile solo se in giacenza di magazzino)
- Spiroxamina (max 3 tratt/anno)
- Famiglia/gruppo:SDHI (Max 2 tratt/anno totali) – Fluxapyroxad, Boscalid (Max 1 Tratt/anno e da preferire in fase di pre-chiusura grappolo)

Se non già in formulazione si consiglia sempre l'aggiunta di zolfi a bassi dosaggi preferibilmente in formulazione liquida (maggior resistenza al dilavamento – attenzione in caso di utilizzo di Dithianon)

Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente o tramite Whatsapp Antonio o Luca

Tutte le indicazioni sui principi attivi, avversità verso le quali sono registrati, limitazioni e dosaggi sono sempre da verificare sulle etichette dei prodotti commerciali e bisogna attenersi scrupolosamente a quanto riportato.